

种子多数,长4毫米,多角形,红色,种柄长约2毫米。

分布于长江以南滨海各省,内地多为栽培供观赏;亦见于日本及朝鲜。

叶革质,倒卵形,先端圆,簇生于枝顶呈假轮生状,经长期栽培,雄蕊常表现退化而不育,结实率亦低。

3a. 秃序海桐

Pittosporum tobira Ait. var. *calvescens* Ohwi in Journ. Jap. Bot. 12: 331, 1936; 张宏达、颜素珠,中山大学学报,1974; 2, 35, 1974. *P. makinoi* Nakai Fl. Sylv. Korea 21: 84, 1936. *P. tobira* Ait. var. *fukienense* Gowda in Journ. Arn. Arb. 32: 310, 1951.

嫩枝及幼叶仅有稀疏短毛,子房被稀疏微毛,花序、苞片及萼片均无毛,其余特征和原种一致。

分布于我国台湾及福建。

4. 木果海桐 山枝仁,山枝茶(四川、贵州)

Pittosporum xylocarpum Hu et Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. n. ser. 1 (1): 95, 1943; 张宏达、颜素珠,中山大学学报,1974; 2, 30, 1974. *P. trigonocarpum* sensu Gowda l. c., non Lévl.

常绿灌木,高3米,嫩枝纤细,无毛,老枝有皮孔。叶聚生于枝顶,二年生,薄革质,倒披针形或狭长椭圆形,长6—13厘米,宽2—4.5厘米,先端渐尖,基部楔形,上面绿色,发亮,下面无毛,干后黄褐色,侧脉11—15对,在上面隐约可见,在下面稍突起,网脉不明显,边缘平展,叶柄长6—15毫米。伞房或伞形花序顶生,无毛,有长约5毫米的花序柄,花梗长短不一,长4—12毫米,纤细,苞片细小,长2毫米,膜质,早落。花黄色,有香气;萼片卵形,大小不等,基部略相连,长1.5—2毫米,略有睫毛;花瓣狭披针形,长1.2厘米,下部2/3紧贴或连生成管状;雄蕊长约8毫米,花药长2毫米;子房长卵形,长5毫米,有短的子房柄,被毛,花柱长3毫米;侧膜胎座3个,有时2个,每个胎座有胚珠2—5个。蒴果卵圆形,长约15毫米,3片(2片)裂开,果片木质,厚1.5—2毫米,内侧有横格,种子4—8个,长3—4毫米,红色,干后变黑色,种柄短,长1—1.5毫米。

分布于四川、贵州。

叶有侧脉11—15对,蒴果卵圆形,3(—2)片裂开,果片木质,厚2毫米,种子4—8个,它和皱叶海桐 *P. crispulum* 容易混淆,后者的蒴果较大,胚珠多达45个,常排成4列,花亦较长。它和厚圆果海桐 *P. rehderianum* 亦很接近,后者叶脉较少,子房无毛,蒴果圆球形,种子较多,种柄较长。

5. 尖萼海桐

Pittosporum subulisepalum Hu et Wang in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. n. ser. 1 (1): 100, 1943.