

厘米。蒴果长筒形，长 1.8 厘米，宽 7 毫米，被柔毛，子房柄长约 3 毫米，宿存花柱长 3 毫米，3 片裂开，果片厚约 1 毫米。种子 16 个。

分布于广东北部、叶与原种一致，惟蒴果长筒形，长 1.8 厘米，宽不过 7 毫米。

7. 缝线海桐 珠木，黄珠子(广西)

Pittosporum perryanum Gowda in Journ. Arn. Arb. 32: 290, 1951; 张宏达、颜素珠，中山大学学报，1974: 2, 34, 1974.

常绿小灌木，高 1—2 米，嫩枝无毛，略有皮孔。叶常 3—5 片生枝顶，二年生，薄革质，干后近于膜质，长椭圆形或倒卵状长椭圆形，长 8—17 厘米，宽 4—6 厘米，无毛，上面绿色，有光泽，下面浅绿色，干后带黄绿色，先端尖锐，基部楔形，侧脉每边 7 条，在下面较明显，干后略突起，离边缘 5—8 毫米处互相结合，末次小脉围成的网眼近四方形，宽 3—4 毫米，在下面很明显，边缘平展，不起皱折，叶柄长 8—15 毫米。花 6—9 朵排成伞形花序，秃净，苞片线形，长 5—7 毫米，花梗长 5—10 毫米；萼片长 2 毫米，卵形，无毛；花瓣长 10 毫米；雄蕊长 7—8 毫米；子房无毛，心皮 3—4 个，每个胎座有胚珠 4—6 个，花柱长 3 毫米。蒴果 1—4 个生于枝顶，椭圆形，长 2—3 厘米，缝线 3 条突起成棱状，或偶为长筒形，长达 4 厘米，无毛，子房柄长 2—3 毫米，3—4 片裂开，果片薄，革质，内侧黄褐色，无横格；种柄长 3 毫米，每果片 4—6 条，排成 2 列，分散于纵长胎座上，相距 3—5 毫米；种子 15—18 个，通常只有 8—9 个，扁圆形，长约 6 毫米，红色，干后黄红色。果梗粗而短，长约 1 厘米。

分布于广西、贵州东南部、广东西部(海南岛)及云南东南部。

叶片较大，网眼较宽，干后呈现多数灰白色方格，子房无毛，胎座 3 个，蒴果长筒形，长 3 厘米，或更长，子房柄明显，腹缝线突起成 3 条纵棱，种子长 6—7 毫米，它和光叶海桐 *P. glabratum* 很接近，只是后者的叶较小，蒴果较短，无明显的子房柄，亦缺乏纵棱。

用果实及种子煮水，治黄疸病，据说有效。

7a. 狭叶缝线海桐

Pittosporum perryanum Gowda var. *linearifolium* Chang et Yan, 中山大学学报，1974: 2, 35, 1974.

灌木，高 1.5 米，嫩枝无毛。叶膜质，窄披针形，长 9—13 厘米，宽 1—2 厘米，多少镰刀状，侧脉 9—12 对，在下面稍突起，叶柄长 7—10 毫米。花未见。蒴果单生于枝顶，椭圆形，长约 1.5 厘米，无毛，子房柄极短，3 片裂开，果片薄革质，缝线 3 条，突起，种子 5—7 个，长约 5 毫米；果梗长 1—1.5 厘米。

分布于贵州东南部。

嫩枝无毛，叶膜质；带状披针形，蒴果椭圆形，长约 1.5 厘米，无毛，腹缝线突起。和原种 *P. perryanum* 的区别在于叶片狭窄，蒴果较小。

另一方面，它和狭叶海桐 *P. glabratum* var. *neriifolium* 很相似，但叶片膜质，蒴果有突起的缝线。