

米,心皮及果2—3数的,均属于本种的范畴。种子入药叫广梔仁。

10a. 线叶柄果海桐

Pittosporum podocarpum Gagn. var. **angustatum** Gowda l. c.; 秦岭植物志, 1 (2): 464, 1974.

灌木高2米,嫩枝无毛。叶簇生于枝顶,带状或狭窄披针形,长8—15厘米,宽1—2厘米,无毛。伞形花序顶生,有花4—18朵,苞片卵形、长2毫米,花梗长1—2厘米,无毛;萼片卵形,有睫毛,长2毫米;花瓣长11—14毫米;雄蕊长4—9毫米;子房被毛,花柱无毛,侧膜胎座3个,胚珠15—20个。蒴果梨形或椭圆形,长2—2.5厘米,3片裂开、果片薄,革质,有种子6个,种子红色,长5—6毫米,种柄长3毫米。

分布于四川、湖北、云南、贵州、甘肃及陕西等省区;亦见于缅甸北部及印度东北部。

这个变种具线形的叶片,子房3个胎座,被柔毛,它和狭叶海桐 *P. glabratum* var. *neriifolium* 非常接近,只是子房被毛。

11. 稜果海桐 瘦鱼蓼,鸡骨头,公梔子(贵州)

Pittosporum trigonocarpum Lévl. in Fedde, Rep. Spec. Nov. 11: 492, 1913, 张宏达、颜素珠,中山大学学报, 1974: 2, 36, 1974. *P. glabratum* sensu Rehd. in Journ. Arn. Arb. 12: 280, 1931, non Lindl.

常绿灌木、嫩枝无毛,嫩芽有短柔毛,老枝灰色,有皮孔。叶簇生于枝顶,二年生,革质,倒卵形或矩圆倒披针形,长7—14厘米,宽2.5—4厘米,先端急短尖,基部窄楔形,上面绿色、发亮,干后褐绿色,下面浅褐色,无毛;侧脉约6对,与网脉在上下两面均不明显,边缘平展,叶柄长约1厘米。伞形花序3—5枝顶生,花多数;花梗长1—2.5厘米,纤细,无毛;萼片卵形,长2毫米,有睫毛;花瓣长1.2厘米,分离,或部分联合;雄蕊长8毫米;雌蕊与雄蕊等长,子房有柔毛,侧膜胎座3个,胚珠9—15个。蒴果常单生,椭圆形,干后三角形或圆形,长2.7厘米,有毛,子房柄短,长不过2毫米,宿存花柱长3毫米,果梗长约1厘米,有柔毛,3片裂开,果片薄,革质,表面粗糙,每片有种子3—5个;种子红色,长约5—6厘米,种柄长2毫米,压扁,散生于纵长的胎座上。

分布于贵州南部。

这个种和柄果海桐 *P. podocarpum* 很近似,只是花较短小,蒴果无明显的子房柄。根皮入药,治多年哮喘。

12. 密脉海桐

Pittosporum densinervatum Chang et Yan. in Acta Phytotax. Sin. 16:86, 1978.

常绿灌木,高1米;嫩枝粗壮,无毛;老枝灰褐色,有皮孔。叶簇生于枝顶,革质,椭圆形,长4—6厘米,宽2—3厘米,先端尖锐,基部阔楔形,上面深绿色,干后暗绿色,无光泽,下面灰绿色,无毛;侧脉7—8对,彼此相隔3—4毫米,在上面下陷,在下面突起;网脉在上下两面不明显,边缘反卷;叶柄长4—6毫米,扁平。花未见。蒴果生于枝顶叶腋内,长