

1—1.3 厘米,单独或 2—5 个排成伞形状,果柄长 1.5—2 厘米,无毛,宿存花柱长 3 毫米,柱头圆头状;果片薄,3 片裂开;侧膜胎座 3 个,位于果片中部;种子 21 个,长 2.5—3 毫米,种柄长约 1 毫米。

分布于湖南西部。

叶片为细小椭圆形,侧脉排列较密,干后暗晦无光,蒴果 3 片裂开,果壳无毛,胎座位于果片中部,种子 21 个。

13. 贵州海桐

Pittosporum kweichowense Gowda in Journ. Arn. Arb. 32: 296, 1951; 张宏达、颜素珠,中山大学学报,1974; 2, 33, 1974.

常绿灌木,高 1.5 米,嫩枝有微毛,不久变秃净,老枝灰白色,皮孔近于圆形。叶分散于嫩枝上,一年生或二年生,坚革质,窄矩圆形,长 3—5 厘米,宽 1—1.5 厘米,先端略尖,稀为渐尖,基部楔形;上面深绿色,发亮;下面无毛,黄绿色;侧脉 5—6 对,与网脉在上下两面均不很明显;边缘平展,或偶有皱折;叶柄长 5 毫米。花 2—3 朵生于枝顶叶腋内,苞片卵形,长 1.5 毫米,有睫毛;花梗长 4—6 毫米,有褐毛;萼片极短,长不及 1 毫米,三角卵形,先端钝,有睫毛;花瓣分离,黄色,长 7 毫米;花丝长 5 毫米,花药长 1 毫米;子房有褐毛,子房柄短,侧膜胎座 3 个,每个胎座有胚珠 2—3 个。蒴果长筒形,单生于枝顶,长 1.2—1.5 毫米,被毛,果梗短,稍粗壮,3 片裂开,果片薄,长椭圆形,内侧无明显的横格,种柄扁平,长 2—3 毫米,位于果片中部,种子 6—8 个,圆形,直径 5—6 毫米,红色。

分布于贵州。

叶的形态近似薄萼海桐 *P. leptosepalum* 及少花海桐 *P. pauciflorum*, 但薄萼海桐的嫩枝无毛,子房只有 2 个胎座,萼片长 3—4 毫米;少花海桐虽然也具有 3 个胎座,但叶较狭长、萼片更长,胚珠及种子较多。

14. 小果海桐

Pittosporum parvicapsulare Chang et Yan. in Acta phytotax. Sin. 16: 87, 1978.

P. oligocarpum Gowda in Journ. Arn. Arb. 32: 304, 1951, quoad *Ching* 1874, *Tsang* 27648, non Hayata.

灌木高 2 米,嫩枝无毛,纤细,干后暗褐色,老枝黑暗色,有稀疏的灰色皮孔。叶簇生于枝顶,二年生,革质,矩圆形,或矩圆状卵形,长 3.5—6 厘米,宽 1.3—2.3 厘米;先端渐尖,基部楔形;上面深绿色,发亮,下面淡绿色,无毛,干后带褐色;侧脉 7—8 对,与网脉在上面稍下陷,在下面稍突起;边缘平展;叶柄长 5—7 毫米,纤细。花未见。伞形状果序生枝顶,有蒴果 2—5 个,果柄长约 1 厘米,纤细,无毛。蒴果椭圆形,长 6—8 毫米,宽 4—5 毫米,被褐色柔毛,子房柄不明显,宿存花柱长 2—2.5 毫米,3 片裂开,稀为 2 片,果片薄,厚不及 1 毫米,内侧无明显横格。种子 9—12 个,长 2—2.5 毫米,种柄极短。

分布于广西及湖南接壤地区,亦见于浙江。