

子 10—12 个,长 3.5 毫米。

分布于广西,常见于石灰岩山地。

本种和卵果海桐 *P. ovoideum* 有亲缘关系,但叶片倍小,萼片长线形,花柱倍短,胚珠减半,果壳亦较薄,厚 1—1.5 毫米。

22. 薄片海桐

Pittosporum tenuivalvatum Chang et Yan. in Acta phytota . Sin. 16: 87, 1978.

常绿灌木或小乔木,嫩枝无毛,老枝灰色,有稀疏皮孔。叶膜质,矩圆形或倒卵披针形,长 7—12 厘米,宽 2.5—4.5 厘米;先端渐尖或短尖,基部楔形;上面深绿色,干后暗晦,下面浅绿色,无毛;侧脉 7—9 对,在上面不明显,在下面隐约可见,网脉不明显;边缘稍皱折;叶柄长 1—1.5 厘米。伞形花序顶生,有花 2—8 朵,花序柄短,花梗纤细,无毛,长约 1 厘米;萼片三角卵形,长 2 毫米,无毛,边缘有小睫毛;花瓣离生,长 1 厘米,宽 1—1.5 毫米;雄蕊长 7—8 毫米;雌蕊长 6 毫米,子房被柔毛,有短的子房柄,花柱无毛,长 2.5 毫米,侧膜胎座 2 个,胚珠 4—22 个。果序有蒴果 1—2,果梗长 1.5—2 厘米,纤细;蒴果倒卵形,长约 2 厘米,子房柄长 3—4 毫米,2 片裂开,果片薄,厚约 0.4 毫米,倒卵形,长 2—2.5 厘米,宽 1—1.6 厘米,种子 8—12 个,近圆形,长 6—7 毫米,胎座位于果片中部到基部,种柄长 2.5 毫米,纤细。

分布于广西的西南部。

本种的叶膜质,伞形花序有柄,花序柄,花梗及果梗纤细,无毛,花萼无毛,蒴果倒卵形,长 2 厘米,有较长的子房柄,果片极薄,种子圆形,直径 5—7 毫米。它和贫脉海桐 *P. oligophlebium* 较接近,后者侧脉较少,花梗有毛,花瓣合生,花柱较长,胚珠较少。由于本种果实较大、子房柄明显、因此它和 2 片的柄果海桐 *P. podocarpum* 有相似之处,但后者的叶革质,花较长,果长梨形,果壳稍厚,子房柄特别长,种柄亦较长。

23. 聚花海桐 图版 6: 4—5

Pittosporum balansae DC. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 4: 1071, 1904; Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France ser. 4, 8: 544, 1908; Gowda l. c. 316; 张宏达、颜素珠,中山大学学报, 1974: 2, 38, 1974. *Pittosporum confertum* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 23, 237, pl. 46, 1935; Gowda l. c. 315; 海南植物志, 1: 450, 1964. *Pittosporum ferrugineum* sensu Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 85, 1927, non Aiton.

常绿灌木,嫩枝被褐色柔毛,不久变秃净。叶簇生于枝顶,呈对生或轮生状,两年生,薄革质,矩圆形,长 6—11 厘米,宽 2—4 厘米;先端尖锐,尖头钝,基部楔形;上面绿色,发亮,下面初时被柔毛,以后变秃净;侧脉 6—7 对,靠近边缘 2—3 毫米处相结合,在上面不明显,在下面略突起,网脉不明显,边缘平展;叶柄长 5—15 毫米,初时有柔毛,以后变秃净。伞形花序单独或 2—3 枝簇生于枝顶叶腋内,每个花序有花 3—9 朵,花序柄长 1—1.5