

展;雄蕊长8毫米;雌蕊比雄蕊长,子房长筒形,被毛,子房壁薄,子房柄长1.5毫米、花柱长3—4毫米,侧膜胎座2个,胚珠4—8个。果序有蒴果7—14个,果梗长7—12毫米;蒴果长椭圆形,长1.2—1.5厘米,宽6—7毫米,子房柄长3毫米,2片裂开,果片薄木质,厚不过1毫米;种子5—7个,胎座位于果片中部至基部,种柄极短;宿存花柱长3—4毫米。

分布于四川东南部及湖南西部。

嫩枝无毛,叶倒披针形,伞形花序多枝丛生,花梗无毛,萼片连成杯状,花冠管状,子房被毛,胚珠4—8个,蒴果长椭圆形,子房柄明显,宿存花柱长3—4毫米,在具有管状花冠的国产四个种类中,只有本种是具浅杯状的花萼。

32. 异叶海桐 臭皮,臭椿皮(云南)

Pittosporum heterophyllum Franch. in Bull. Soc. Bot. France 33: 415, 1886; Gowda in Journ. Arn. Arb. 32: 341, 1951. 中国高等植物图鉴 2: 154, 1972. *P. truncatum* var. *tsaii* Gowda in Journ. Arn. Arb. 32: 340, 1951.

灌木高2.5米,嫩枝无毛,灰褐色,老枝无皮孔。叶簇生于枝顶,薄革质,二年生,线形,狭窄披针形,或倒披针形,长4—8厘米,宽1—1.5厘米,有时更狭窄,先端略尖,尖头钝,基部楔形,上面绿色,发亮,下面淡绿色,无毛,侧脉5—6对,与网脉在上下两面均不明显;边缘平展;叶柄长3—4毫米。花1—5朵簇生于枝顶,作伞形状,花梗长7—15毫米,无毛,苞片早落;萼片卵形,长2—2.5毫米,基部稍合生,先端钝,无毛,或有睫毛;花瓣长6毫米,合生,披针形,先端圆;雄蕊长4—5毫米,花药长1.5毫米;雌蕊比雄蕊稍短,子房被毛,花柱长1.5毫米;侧膜胎座2个,胚珠5—8个。蒴果近球形,稍压扁,直径6毫米,2片裂开,果片薄,木质,有种子5—8个。种子长2.5毫米,干后黑色,种柄极短;宿存花柱长2毫米。

分布于西藏东南部、云南北部,海拔1900—3000米,亦见于四川木里。

嫩枝无毛,叶薄革质,窄披针形,稀为倒披针形而具有钝的叶尖,花少数,短小,花瓣合生,子房有毛,花柱短,胚珠5—8个。

32a. 带叶海桐

Pittosporum heterophyllum Fr. var. *ledoides* Hand.-Mzt. Symb. Sin. 7: 448, 1929.

小灌木,高50厘米,叶带状,长5厘米,宽3毫米;叶柄极短,伞形花序生枝顶,有花数朵,花梗极短,长约2毫米。蒴果未见。

分布于云南大姚(白盐井)。此外 *P. heterophyllum* var. *sessile* Gowda 亦采自大姚,据称叶无柄,子房无毛,很可能是和 Handel-Mazzetti 的变种是同一类型。

33. 薄萼海桐

Pittosporum leptosepalum Gowda in Journ. Arn. Arb. 32: 339, 1951, pro parte, quoad typo et Tsang 27960; 张宏达、颜素珠,中山大学学报,1974; 2, 42,