

厘米,先端尖锐,基部楔形;三出脉不很强烈;上面深绿色,发亮;下面灰白色,无毛;侧脉7—9对,在上面不明显,在下面隐约可见,网状小脉在上下两面均不明显;叶柄长2—4.5厘米,稍纤细。头状花序长2—2.5厘米,花序柄长1—1.5厘米,无鳞状小苞片;总苞片5—7片,卵圆形,大小不等,长7—10毫米,外面被暗褐色短柔毛;萼筒极短,先端平截;花瓣匙形,长1.5—1.8厘米,宽5—6毫米;雄蕊6—8个,约与花瓣等长;子房无毛,基部围以短萼筒,花柱与雄蕊等长,先端尖细。头状果序宽2—2.5厘米,有蒴果5个,果序柄长1—2厘米;蒴果卵圆形,长约1厘米,果皮薄,木质,先端裂成4片;种子多数,扁平。花期4月。

分布于云南东南部,贵州东南部及广西西部;亦见于越南北部。

本种的叶片矩圆形,花瓣较短而窄,花序柄较短,蒴果亦较小,易与红花荷 *R. championii* 相区别。越南产的 *R. championii* var. *brilletii* H. Lec. 可能属于本种。

3. 显脉红花荷

Rhodoleia henryi Tong l. c.; Exell l. c.; 张宏达,文献同上。

常绿乔木高15米,小枝干后黑褐色,无毛。叶革质,卵状椭圆形,长11厘米,宽3.5—5.5厘米,先端渐尖,基部阔楔形,有明显的三出脉;上面深绿色,有光泽;下面黄绿色,无毛;侧脉约6对,与中肋成 30° 交角,干后在上面下陷,在下面突起;网脉在上面稍下陷,在下面显著;叶柄长约5厘米,无毛。头状花序长3—3.5厘米,有花5朵;花序柄1—1.5厘米,无鳞片状小苞片;总苞片多数,大小不等,下部的较小,上部的较大,外侧有锈褐色长绒毛;萼筒极短,先端平截,不具萼齿;花瓣2—5片,匙形,长达3厘米,宽6毫米,深红色;雄蕊7—9个,与花瓣等长;子房无毛,花柱长2厘米,先端尖。蒴果未见。

分布于云南的东南部海拔2000—2450米的山地常绿林,除了模式标本之外,仅见第二个标本(李锡文437),叶基部有明显的三出脉,背面无毛,侧脉及网脉干后下陷,头状花序的总苞有锈褐色长绒毛,易与其他种类区别。

4. 大果红花荷

Rhodoleia macrocarpa Chang, 中山大学学报, 1961, 第4期50页; 1973, 第1期56页。

常绿乔木高10米,嫩枝干后黑褐色,有鳞毛。叶革质,椭圆形或长椭圆形,长7—10.5厘米,宽3.5—5.5厘米,先端突然收窄成短的尖头,或有小尖突,基部阔楔形,三出脉不很明显;上面深绿色,干后暗晦无光泽;下面灰白色,有星状鳞片;侧脉8—9对,与中肋成 75° 交角,平缓发出,在上面不明显,在下面略能见;网脉在上下两面均不显著;叶柄长2.5—4厘米,较粗大。花未见。头状果序宽2.5—3.5厘米,有蒴果5个,果序柄长1—1.5厘米,极粗壮,有短柔毛。蒴果长卵形,长1.5—2厘米,宽1.1—1.4厘米,无毛,先端尖锐,宿存花柱极短。种子扁平,有窄翅,长6毫米,宽4毫米,暗褐色。

分布于云南东南部海拔2000—2400米的山地常绿林里。叶椭圆形或长椭圆形,先端