

亚及印度尼西亚。

本种具卵形而薄的叶片,先端尾状渐尖,基部圆形,叶柄在本属的种类当中是最长的,可达4厘米,容易和别的种类区别。在马来西亚及印度尼西亚等地,树高达50米或更高,在云南一带则高度不超过20米。

## 2. 赤水蕈树

*Altingia multinervis* Cheng in Not. For. Inst. Nat. Centr. Univ. Nanking, Dendr. ser. Dec. 20, 1947; 张宏达,文献同上。

常绿乔木;嫩枝略有柔毛,很快变秃净,有皮孔,干后黑褐色;芽体卵形,长约1厘米,外侧有短柔毛,有多数鳞状苞片包裹着。叶革质,卵形或卵状椭圆形,长7—10厘米,宽4—6厘米,先端渐尖,尾部长1厘米,基部圆或钝,稀为微心形,稍不等侧;上面绿色,干后暗晦无光泽,下面浅绿色,无毛;侧脉10—14对,干后在上面显著或稍突起,在下面明显突起,离边缘3毫米处彼此相结合;网脉在上面难见,在下面很明显,边缘有钝锯齿,或靠近基部全缘;叶柄长2—4厘米。花未见。头状果序圆球形,直径2厘米,有蒴果10—18个;果序柄长2—3.5厘米;蒴果几全部藏在头状果序轴内,无宿存花柱,萼齿鳞片状或小瘤状。

分布于贵州赤水县天台山等地。

本种和细青皮 *A. excelsa* 非常接近,只是叶的质地稍厚,侧脉较多,叶的先端不是长尾状。

## 3. 云南蕈树

*Altingia yunnanensis* Rehd. et Wils. in Pl. Wils. 1: 422, 1913; 张宏达,文献同上。

常绿乔木,高约15米;嫩枝略有短柔毛,以后变秃净,干后灰褐色,老枝有皮孔。叶革质、矩圆形,长6—15厘米,宽3.5—6.5厘米,先端急锐尖,基部楔形,或有时略钝;上面绿色,干后稍暗晦略有光泽,下面秃净无毛;侧脉6—9对,在上面稍突起,在下面显著地突起,网脉在上下两面均明显;边缘有明显锯齿,有时下半部近于全缘;叶柄长1—2厘米,无毛;托叶线形,早落。雄花头状花序椭圆形,长约1厘米,常排成圆锥花序,生于枝顶叶腋内,花苞4片,卵形,长1.5厘米,雄蕊多数,近于无柄。雌花头状花序单生或排成总状,每个头状花序有花16—24朵,萼齿鳞片状,花柱长4毫米,被褐色短柔毛,果序柄长3—4厘米,被毛。头状果序近于球形,宽1.5—2.5厘米;蒴果无宿存花柱,先端稍突出头状果序之外;果序柄长3—5厘米;种子细小,有棱。

分布于云南的东南部,常见于红河及南溪河流域。就叶形看来,它和蕈树 *A. chinensis* 较近似,但后者叶倒卵矩圆形,质地稍厚。从目前资料判断,东经105°是两者的分界线。

## 4. 窄叶蕈树