

分布于我国中部、南部及西南各省；亦见于日本及印度。喜生于向阳的丘陵及山地，亦常出现在马尾松林及杉林下，是1种常见的灌木，惟在北回归线以南则未见它的踪迹。

本种植物可供药用。叶用于止血，根及叶用于跌打损伤，有去瘀生新功效。

1a. 红花檵木

Loropetalum chinense Oliver var. **rubrum** Yieh, 中国园艺专刊, 1942, 2: 33;

张宏达, 中山大学学报, 1973, 第1期 61页。

叶与原种相同。花紫红色，长2厘米。分布于湖南长沙岳麓山，多属栽培。

2. 大果檵木

Loropetalum lanceum Hand.-Mzt. in Sinensis, 2: 123, 1931; 张宏达, 中山大学学报, 1960, 第1期, 42页。

常绿乔木，高9—13米，嫩枝纤细，有柔毛；芽体细小，裸露，被星毛。叶薄革质，披针形或卵状披针形，长5—8.5厘米，宽2.5—3.5厘米，先端尾状渐尖，尾部长约1厘米，基部楔形或钝，稍不等侧，上面干后橄榄绿色，略有光泽，无毛，下面初时有毛，至少在脉上有毛，以后变秃净；侧脉约5对，在上面不明显，干后有时稍下陷，在下面稍突起，网脉在上面难见，在下面显著；全缘；叶柄长约5毫米，被绒毛；托叶膜质，早落。花4—5朵聚成短穗状花序，花梗极短，近于无柄，花序柄长3—5毫米，被绒毛；萼筒有星毛，萼齿卵形，长2—2.5毫米；花瓣白色，带状，长1—1.3厘米；雄蕊短小，花丝约与花药等长，药隔突出成短角状；退化雄蕊鳞片状，与雄蕊互生；子房有绒毛，花柱极短。蒴果扁球形，长1.2—1.4厘米，宽1—1.2厘米，稍压扁，先端圆形，有黄褐色绒毛，果柄极短，长约1.5毫米。种子长椭圆形，长6.8—8毫米，黑色，有光泽。

分布于广西十万大山，只见于山地常绿林。

本种的叶披针形，通常秃净无毛，花梗和花序柄均极短，蒴果扁球形，大于1厘米，宿存萼筒长为蒴果的一半。

3. 大叶檵木

Loropetalum subcapitatum Chun ex Chang, 中山大学学报, 1959, 第2期 35页; 1973, 第1期 61页。

常绿小乔木，高8米；嫩枝有星毛，老枝秃净；芽体细小，有褐色绒毛。叶薄革质，卵状矩圆形，或长卵形，长6—10厘米，宽3—5厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部钝或略圆，不等侧，上面绿色，干后暗晦无光泽，有稀疏短柔毛，中肋上有星毛，下面有星毛，至少在脉上有毛，全缘；侧脉7—9对，在上面明显，在下面突起，网脉在下面显著；叶柄长约5毫米，有星毛；托叶早落。花未见。蒴果1—4个排成短穗状果序，长卵形，长9毫米，宽6—7毫米，先端圆，有4/5被萼筒包着，外侧有褐色星状绒毛；果梗极短；果序柄长1—1.5厘米。种子椭圆形，长6—7毫米，黑色，有光泽，种脐白色。

分布于广西的西南部及云南的东南部及西南部。