

分布于我国中部、南部及西南各省；亦见于日本及印度。喜生于向阳的丘陵及山地，亦常出现在马尾松林及杉林下，是1种常见的灌木，惟在北回归线以南则未见它的踪迹。

本种植物可供药用。叶用于止血，根及叶用于跌打损伤，有去瘀生新功效。

1a. 红花榧木

Loropetalum chinense Oliver var. *rubrum* Yieh, 中国园艺专刊, 1942, 2: 33; 张宏达, 中山大学学报, 1973, 第1期 61 页。

叶与原种相同。花紫红色，长2厘米。分布于湖南长沙岳麓山，多属栽培。

2. 大果榧木

Loropetalum lanceum Hand.-Mzt. in *Sinensia*, 2: 123, 1931; 张宏达, 中山大学学报, 1960, 第1期, 42 页。

常绿乔木，高9—13米，嫩枝纤细，有柔毛；芽体细小，裸露，被星毛。叶薄革质，披针形或卵状披针形，长5—8.5厘米，宽2.5—3.5厘米，先端尾状渐尖，尾部长约1厘米，基部楔形或钝，稍不等侧，上面干后橄榄绿色，略有光泽，无毛，下面初时有毛，至少在脉上有毛，以后变秃净；侧脉约5对，在上面不明显，干后有时稍下陷，在下面稍突起，网脉在上面难见，在下面显著；全缘；叶柄长约5毫米，被绒毛；托叶膜质，早落。花4—5朵聚成短穗状花序，花梗极短，近于无柄，花序柄长3—5毫米，被绒毛；萼筒有星毛，萼齿卵形，长2—2.5毫米；花瓣白色，带状，长1—1.3厘米；雄蕊短小，花丝约与花药等长，药隔突出成短角状；退化雄蕊鳞片状，与雄蕊互生；子房有绒毛，花柱极短。蒴果扁球形，长1.2—1.4厘米，宽1—1.2厘米，稍压扁，先端圆形，有黄褐色绒毛，果柄极短，长约1.5毫米。种子长椭圆形，长6.8—8毫米，黑色，有光泽。

分布于广西十万大山，只见于山地常绿林。

本种的叶披针形，通常秃净无毛，花梗和花序柄均极短，蒴果扁球形，大于1厘米，宿存萼筒长为蒴果的一半。

3. 大叶榧木

Loropetalum subcapitatum Chun ex Chang, 中山大学学报, 1959, 第2期 35 页; 1973, 第1期 61 页。

常绿小乔木，高8米；嫩枝有星毛，老枝秃净；芽体细小，有褐色绒毛。叶薄革质，卵状矩圆形，或长卵形，长6—10厘米，宽3—5厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部钝或略圆，不等侧，上面绿色，干后暗晦无光泽，有稀疏短柔毛，中肋上有星毛，下面有星毛，至少在脉上有毛，全缘；侧脉7—9对，在上面明显，在下面突起；网脉在下面显著；叶柄长约5毫米，有星毛；托叶早落。花未见。蒴果1—4个排成短穗状果序，长卵形，长9毫米，宽6—7毫米，先端圆，有4/5被萼筒包着，外侧有褐色星状绒毛；果梗极短；果序柄长1—1.5厘米。种子椭圆形，长6—7毫米，黑色，有光泽，种脐白色。

分布于广西的西南部及云南的东南部及西南部。

本种的叶薄革质，卵状矩圆形，长达 10 厘米，先端尾状渐尖，侧脉 7—9 对，萼筒几与蒴果等长。

11. 金缕梅属——*Hamamelis* Gronov. ex Linn.

Gronovius ex Linn. Gen. 2: 54, 1743; Linn. Sp. Pl. 1:

124, 1753.

落叶灌木或小乔木；嫩枝有绒毛。芽体裸露，有绒毛。叶阔卵形，薄革质或纸质，不等侧，常为心形，羽状脉，第一对侧脉通常有第二次分支侧脉，全缘或有波状齿，有叶柄，托叶披针形，早落。花聚成头状或短穗状花序，两性，4 数；萼筒与子房多少合生，萼齿卵形，4 片，被星毛；花瓣带状，4 片，黄色或淡红色，在花芽时皱折；雄蕊 4 个，花丝极短，花药卵形，2 室，单瓣裂开；退化雄蕊 4 个，鳞片状，与雄蕊互生；子房近于上位或半下位，2 室；花柱 2，极短；胚珠每室 1 个，垂生于心皮室的内上角。蒴果木质，卵圆形，上半部 2 片裂开，每片 2 浅裂；内果皮骨质，常与木质外果皮分离。种子长椭圆形，种皮角质，发亮；胚乳肉质。

6 种，中国 2 种，北美及日本各有 2 种。此外还有化石见于北欧第三纪的地层里。

分 种 检 索 表

- 1. 叶阔倒卵圆形，侧脉 6—8 对，第 1 对侧脉有第二次分支侧脉，基部心形，蒴果长 1.2 厘米…………… 1. 金缕梅 *H. mollis*
- 1. 叶倒卵形，侧脉 4—5 对，第 1 对侧脉不再分支，基部圆形，蒴果长不到 1 厘米…………… 2. 小叶金缕梅 *H. subaequalis*

1. 金缕梅 (中国高等植物图鉴) 图版 17

Hamamelis mollis Oliver in Hook. f. Ic. Pl. 18: t. 1742, 1888; Hook. f. in Bot. Mag. t. 7884, 1903; 中国高等植物图鉴 2: 162, 图 2054. 1972.

落叶灌木或小乔木，高达 8 米；嫩枝有星状绒毛；老枝秃净；芽体长卵形，有灰黄色绒毛。叶纸质或薄革质，阔倒卵圆形，长 8—15 厘米，宽 6—10 厘米，先端短急尖，基部不等侧心形，上面稍粗糙，有稀疏星状毛，不发亮，下面密生灰色星状绒毛；侧脉 6—8 对，最下面 1 对侧脉有明显的第二次侧脉，在上面很显著，在下面突起；边缘有波状钝齿；叶柄长 6—10 毫米，被绒毛，托叶早落。头状或短穗状花序腋生，有花数朵，无花梗，苞片卵形，花序柄短，长不到 5 毫米；萼筒短，与子房合生，萼齿卵形，长 3 毫米，宿存，均被星状绒毛；花瓣带状，长约 1.5 厘米，黄白色；雄蕊 4 个，花丝长 2 毫米，花药与花丝几等长；退化雄蕊 4 个，先端平截；子房有绒毛，花柱长 1—1.5 毫米。蒴果卵圆形，长 1.2 厘米，宽 1 厘米，密被黄褐色星状绒毛，萼筒长约为蒴果 1/3。种子椭圆形，长约 8 毫米，黑色，发亮。花期 5 月。