

4b. 小叶瑞木

Corylopsis multiflora Hance var. *parvifolia* Chang, 中山大学学报, 1960, 第1期37页。

嫩枝无毛。叶膜质,卵形或倒卵形,长3.5—5.5厘米,宽2—3厘米,先端短急尖,基部心形,下面秃净无毛,侧脉7对,边缘有小锯齿,齿突刺毛状;叶柄长6—8毫米,无毛。蒴果硬木质,长1.3厘米、宽1厘米,无毛。

分布于福建,见于南平下庄地区。叶片及蒴果均比原种小得多。虽未见花的标本,从硬木质的蒴果反映出它是瑞木 *C. multiflora* Hance 的变型。

4c. 心叶瑞木

Corylopsis multiflora var. *cordata* (Merr.) Chang, stat. nov.

Corylopsis cordata Merr. ex Li in Journ. Arn. Arb. 24: 445. 1943. syn. nov. *Corylopsis multiflora* sensu Chang, 中山大学学报 1959, 第2期, 36页。

和正种的区别,在于嫩枝无毛,叶片较宽,下面无毛,蒴果较小。

产地 广西,十万大山;模式及付模式藏中山大学标本室。

系2. 少花系——Ser. *Pauciflorae* Harms l. c.

花序有花数朵,花瓣匙形,退化雄蕊简单,子房壁薄,蒴果较小。

5. 少花蜡瓣花

Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 1: 48. t. 20. 1835; Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Form. 5: 26. 1932; Li, Woody Fl. Taiwan 263. 1963. *Corylopsis matsudae* Kanehira et Sasaki in Trans. Nat. Hist. Soc. 20: 383. 1930; Yamamoto in Suppl. Icon. Pl. Form. 5: 25. f. 8. 1932.

灌木,嫩枝有毛,顶芽外面无毛。叶卵状椭圆形或广卵形,长3—6.5厘米,宽2—3.5厘米,先端锐尖,基部圆形或微心形、稍不对称,上面无毛,下面除侧脉有长毛外其余部分无毛,侧脉6—8对,第一对侧脉第二次分支不强烈,边缘上半部有钝齿和小齿突,叶柄长5—10毫米,纤细,有柔毛。总状花序腋生,长1—2厘米;总苞状鳞片外面无毛,卵圆形,长约1厘米;苞片阔卵形,长7—8毫米,外面无毛;小苞片2片,比苞片稍短小;花序柄短,无毛;花序轴多少被毛,有花2—5朵;萼筒无毛,萼齿钝三角形,无毛;花瓣阔倒卵形,长6—7毫米;退化雄蕊不分裂,先端平截;雄蕊长5—6毫米;子房无毛,花柱长5—6毫米。蒴果卵圆形,长6—8毫米,无毛,种子长椭圆形,黑色,发亮。

产地 我国台湾;亦分布于日本。

6. 桤叶蜡瓣花

Corylopsis alnifolia (Lévl.) Schneid. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12: 379, 1913. *Berchemia alnifolia* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 10: 433, 1912.