

嫩枝及芽体无毛。叶阔卵形或矩圆状倒卵形，先端尖或渐尖，基部不等侧心形，或近于平截，下面带灰色，秃净无毛，或仅在背脉上有毛，边缘有刺状齿突。总状花序长3—4厘米，花序柄及花序轴均有绒毛，总苞状鳞片有毛，萼筒及子房有毛，萼齿无毛。蒴果有星毛。

分布于四川、贵州东北部、湖南、江西、广东及广西等省区，在海拔1000米以上的山脊较常见。和原种的区别在于嫩枝无毛，叶较窄、仅在下面有毛，或仅背脉上有毛。

9. 红药蜡瓣花

Corylopsis veitchiana Bean in Curtis's Bot. Mag. t. 8349, 1910; Rehd. et Wils. l. c.

落叶灌木；嫩枝无毛，老枝暗褐色，有皮孔；芽体长椭圆形，外侧无毛。叶倒卵形或椭圆形，长5—10厘米，宽3—6厘米，先端急短尖，基部不等侧心形；上面秃净无毛，下面带灰色，脉上有毛或秃净无毛；侧脉6—8对，第一对侧脉离基部稍远，第二次分支侧脉较强烈；边缘有锯齿，齿尖刺毛状；叶柄长5—8毫米，无毛；托叶矩圆披针形，长2.5厘米。总状花序长3—4厘米，总苞状鳞片卵圆形，2—4片，长1.3厘米，外面无毛；苞片卵形，长5—6毫米，有绒毛；小苞片2个，矩圆形，有毛；花序柄长1厘米，花序轴长2—3厘米，均有绒毛，基部有1—2个叶片；萼筒有星毛，萼齿卵形，先端圆，外面有毛，兼有睫毛；花瓣匙形，长5—6毫米，宽3—4毫米；雄蕊稍突出花冠外，花药红褐色；退化雄蕊2深裂，先端尖，比萼齿稍长；子房有星状绒毛，与萼筒合生，花柱长5—6毫米。果序长5—6厘米，蒴果近圆卵形，长7—8毫米，有星毛。种子长4—5毫米，黑色，有光泽，种脐白色。

分布于安徽、湖北及四川东部。

嫩枝无毛，叶倒卵形或椭圆形，幼嫩时背脉上有毛，老时秃净无毛，叶柄长5—8毫米，无毛，总苞状鳞片无毛，萼筒及萼齿均有星毛，花瓣长5—6毫米，雄蕊及花柱比花瓣为长。从上列特征看来，它很接近蜡瓣花 *C. sinensis*，只是叶片无毛，萼齿有毛，雄蕊长于花瓣，因此它可能是后者一个变型。由于嫩枝及叶片无毛，容易和秃蜡瓣花 *C. sinensis* var. *calvescens* 混淆起来，后者萼齿无毛，雄蕊不突出花外。

10. 滇蜡瓣花

Corylopsis yunnanensis Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 226, 1912.

落叶灌木，高达3米；嫩枝有绒毛，干后带灰色，老枝暗褐色，无毛，有皮孔；芽体矩圆形，外侧无毛。叶倒卵圆形，长5—8厘米，宽3—6厘米，先端圆形，有1个三角状小尖头，基部不等侧心形；上面暗绿色，初时有柔毛，老叶变秃净；下面灰色，有星毛，或仅背脉上有长毛；侧脉约8对，第一对侧脉很靠近基部，第二次分支侧脉不强烈，在上面显著下陷，在下面突起，侧脉之间的平行小脉亦明显下陷；边缘有锯齿，齿尖稍突出；叶柄长约1厘米，有毛；托叶矩圆形，外面无毛。总状花序长1.5—2.5厘米，花序轴有黄褐色长绒毛，花序柄长不到1厘米，被褐色绒毛，基部有叶片2片；总苞状鳞片卵圆形，长1—1.8厘米，外面