

截,稀为阔楔形,稍不等侧;上面除中肋外秃净无毛,下面密生绒毛;侧脉 10—12 对,在上面下陷,在下面突起,第一对侧脉第二次分支侧脉不强烈;边缘上半部有小锯齿,或近于全缘;叶柄长 1—2 厘米,有绒毛;托叶矩状披针形,长约 2.5 厘米,外面无毛。总状果序生于具有 1—2 片叶子的侧枝顶端,总苞状鳞片 4—5 片,卵形,长 1.5—2 厘米,外侧无毛,内面有长丝毛。花未见。果序长 8—9 厘米,果序柄长约 2 厘米,果序轴长 6—7 厘米,均有褐色长绒毛,有蒴果 20—40 个,宿存苞片卵形,长 6—7 毫米,有柔毛;小苞片矩圆披针形,长 3—4 毫米,有毛。蒴果长 6—7 毫米,有绒毛,宿存花柱长 1.5 毫米。种子长 3—4 毫米。

分布于云南贡山的求江及独龙河流域,海拔 1350—2000 米处。

嫩枝初时有柔毛,叶椭圆形,下面有绒毛,侧脉多达 12 条,果序长 8—9 厘米,蒴果较多,有绒毛。它和滇蜡瓣花 *C. yunnanensis* 及绒毛蜡瓣花 *C. velutina* 很接近,但后二者的花序较短,花的数目较少,叶脉亦较稀疏。

13. 圆叶蜡瓣花

Corylopsis rotundifolia Chang, 中山大学学报, 1960, 第 1 期 37 页。

Corylopsis n. sp. Diels in Engler Bot. Jahrb. 29: 380, 1900.

落叶灌木,高 2—3 米;嫩枝有黄褐色绒毛,老枝秃净,有细小皮孔,干后褐色;芽体长卵形,外面有绒毛。叶圆形或近于圆形,直径 4—8 厘米,稀为短圆形,上面绿色,中脉及侧脉有短柔毛,下面有稀疏短柔毛,脉上有长毛;先端圆形,有 1 个短尖头,基部心形,近于等侧;侧脉 6—9 对,第一对侧脉第二次分支侧脉不强烈;边缘有锯齿,齿尖长 1 毫米;叶柄长 7—12 毫米,有绒毛;托叶矩圆形,长 8—13 毫米,宽 4 毫米,内外两面均有黄褐色柔毛,早落。总状花序生于具有 2—3 片叶子的枝顶;总苞状鳞片 4—6 片,卵圆形,长 1.2—1.5 厘米,宽 1—1.2 厘米,内外两面均有褐色绒毛;苞片 1 个,卵形,长 4 毫米,有毛;小苞片 2 个,矩圆形,长 2—3 毫米,有毛;花序柄长约 1.5 厘米,花序轴长 1.5—2.5 厘米,均有绒毛;萼筒长 1.5 毫米,无毛,萼齿卵圆形,长 1 毫米,先端圆;花瓣广倒卵形,长 3 毫米,宽 2.5 毫米,有短柄;雄蕊长 2 毫米;退化雄蕊 2 裂,比萼齿略短,先端钝;子房无毛,花柱长 1.5 毫米,柱头稍膨大。果序长 4.5 厘米,有蒴果 10—17 个;蒴果长 6 毫米。种子白色,长 3.5 毫米。

分布于四川的南川金佛山及贵州印江。

嫩叶有毛,叶圆形,下面有疏毛,脉上有长毛,萼筒及萼齿无毛,花瓣广倒卵形,长 3 毫米,雄蕊长 2 毫米,退化雄蕊完全 2 裂,子房无毛,花柱长 1.5 毫米。花的形态和短柱蜡瓣花 *C. brevistyla* 有点相似,但后者嫩枝无毛,叶倒卵形,花瓣及雄蕊较长,子房与萼筒分离。

14. 黔蜡瓣花

Corylopsis obovata Chang in Sunyatsenia 7: 72, pl. 13, 1948.

落叶灌木,嫩枝有褐色星毛,老枝秃净;芽体长卵形,外面有灰色柔毛。叶膜质,倒卵