

常绿灌木或小乔木，高5米；嫩枝略有棱，有鳞垢；芽体卵形，长6毫米，有鳞垢及星毛。叶厚革质，椭圆形或卵状椭圆形，长7—12厘米，宽3.5—6.5厘米，先端急尖或略钝，偶为圆形，基部圆形或钝，上面绿色发亮，下面浅绿色，无毛；侧脉5—6对，与中肋均在上下面下陷，在下面突起，网脉在下面很明显；全缘或靠近先端有2—3个齿突；叶柄长7—10毫米，极粗壮，略有鳞垢或秃净，托叶早落。花未见。总状果序腋生，长5—7厘米，果序轴及果序柄都有鳞垢，果梗长2—5毫米，无毛。蒴果卵圆形，长约1.5厘米，宽1厘米，先端尖，宿存花柱长2—4毫米，外侧有黄褐色星状绒毛。种子长7毫米，褐色，有光泽。

分布于广东北部及广西北部。

嫩枝有棱，无毛，叶厚革质，椭圆形，长达12厘米，宽达6.5厘米，无毛，全缘或有几个齿缺，总状果序有时排成圆锥状，蒴果较大，长达1.5厘米。

3. 杨梅叶蚊母树(浙江：萍柴) 图版23

Distylium myricoides Hemsl. in Hook. f. Ic. Pl. 29: sub. pl. 2835, 1907; Cheng l. c.; Metcalf in Lingn. Sci. Journ. 17: 76, 1938; Walker in Journ. Arn. Arb. 25: 328, 1944; 中国高等植物图鉴 2: 167. 图 2063. 1972.

常绿灌木或小乔木，嫩枝有鳞垢，老枝无毛，有皮孔，干后灰褐色；芽体无鳞状苞片，外面有鳞垢。叶革质，矩圆形或倒披针形，长5—11厘米，宽2—4厘米，先端锐尖，基部楔形，上面绿色，干后暗晦无光泽，下面秃净无毛；侧脉约6对，干后在上面下陷，在下面突起，网脉在上面不明显，在下面能见；边缘上半部有数个小齿突；叶柄长5—8毫米，有鳞垢；托叶早落。总状花序腋生，长1—3厘米，雄花与两性花同在1个花序上，两性花位于花序顶端，花序轴有鳞垢，苞片披针形，长2—3毫米；萼筒极短，萼齿3—5个，披针形，长约3毫米，有鳞垢；雄蕊3—8个，花药长约3毫米，红色，花丝长不及2毫米；子房上位，有星毛，花柱长6—8毫米。雄花的萼筒很短，雄蕊长短不一，无退化子房。蒴果卵圆形，长1—1.2厘米，有黄褐色星毛，先端尖，裂为4片，基部无宿存萼筒。种子长6—7毫米，褐色，有光泽。

分布很广，见于四川、安徽、浙江、福建、江西、广东、广西、湖南及贵州东部。

3a. 亮叶蚊母树

Distylium myricoides Hemsl. var. **nitidum** Chang, 中山大学学报, 1960, 第1期40页。

常绿小乔木。叶矩圆形或倒卵矩圆形，上面深绿色，发亮，全缘，先端略钝。蒴果近于圆球形，直径1厘米，先端钝。

分布于浙江、安徽、江西、湖南及广东等省。叶干后深绿色，发亮，边缘无锯齿，蒴果近于圆形，和原种有所区别。

4. 鳞毛蚊母树

Distylium elaeagnoides Chang, 中山大学学报, 1959, 第2期37页。



杨梅叶蚊母树 *Distylium myricoides* Hemsl.

1. 花枝, 2. 果枝, 3. 花, 4. 萼片, 5. 花药, 6. 雌蕊。(冯钟元绘)