

常绿灌木或小乔木，高6米；嫩枝密生鳞毛，老枝秃净，有皮孔，干后灰褐色；芽体裸露，细小卵形，密被鳞毛。叶革质，倒卵形或倒卵矩圆形，长5—10厘米，宽2.5—4.5厘米，先端钝，有时略圆，基部楔形，上面绿色，干后稍暗晦或略发亮，幼嫩时有鳞毛，以后变秃净，下面密被银灰色鳞毛，常宿存不脱落；侧脉4—5对，在上面不明显，在下面稍突起，网脉在上下两面均不明显；全缘无锯齿；叶柄长8—12厘米，有鳞毛。花未见。总状果序腋生，长3—5厘米，果序轴有鳞毛。蒴果长卵圆形，长1.6厘米，宽8毫米，先端长尖，基部楔形，外面密生灰色鳞毛，宿存花柱长2—3毫米，2片裂开，每片2浅裂，基部无宿存萼筒。种子卵圆形，长5—6毫米，褐色，有光泽。

分布于广东北部的乳源，湖南江华，广西北部的龙胜及南部防城的中越边境上的山地常绿林里。叶及蒴果有银灰色鳞毛，叶倒卵形，先端钝，近似胡颓子。

5. 屏边蚊母树

Distylium pingpienense (Hu) Walk. in Journ. Arn. Arb. 25: 331, f. 3, a, 1944. *Sycopsis pingpienensis* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Bot. 10: 149, 1940.

常绿灌木高3米；嫩枝有褐色星状绒毛，老枝秃净，有皮孔，干后褐色；芽体有褐色绒毛。叶薄革质，卵状披针形或披针形，长7—14厘米，宽2.5—3.5厘米，先端尾状渐尖，尾部长1.5—2.5厘米，基部圆形，稍不整正；上面深绿色，发亮，下面有褐色星状绒毛，侧脉约6对，在上面略下陷，在下面突起；网脉在上面隐约可见，在下面稍明显，边缘无锯齿；叶柄长7—10毫米，有星毛；托叶早落。花未见。总状果序腋生，长3—4厘米，有褐色星状绒毛。蒴果卵圆形，长1.2厘米，外面有褐色星状绒毛，先端尖，沿室间2片裂开，每片2浅裂，基部无宿存萼筒，果梗长3—4毫米，被毛。种子卵圆形，长5—6毫米；褐色，有光泽。

分布于云南的东南部。小枝纤细，被锈褐色星状绒毛，叶薄革质，卵状披针形，先端尾状渐尖，基部圆形，下面有褐色星状绒毛。它和黔蚊母树 *D. tsiangii* 较接近，但本种的叶尖长尾状，基部圆形，果实较小。

5a. 锯齿蚊母树

Distylium pingpienense Walk. var. *serratum* Walk. l. c.

小乔木，高8米，小枝纤细，有褐色星状绒毛。叶革质或坚革质，卵状披针形，长7—11厘米，宽2.5—3.7厘米，先端尾状渐尖，基部圆形，下面有稀疏柔毛，或变秃净，边缘上半部有1—3个小锯齿，叶柄长约1厘米，被柔毛。雄花穗状花序腋生，长1—1.5厘米，苞片矩圆形，长6—7毫米，有褐色星状绒毛；萼筒极短，萼齿披针形，长2—3毫米，有星状绒毛；雄蕊5个，花丝长1.5—2.5毫米，长短不一，花药卵圆形，长1.5—2毫米。果序长4—5厘米，蒴果有褐色星状绒毛。

分布于湖北巴东及贵州的遵义和绥阳。叶的靠先端边缘有数个小锯齿，叶片硬革质，可与原种区别。