

形, 裸露, 有褐毛。叶薄革质, 矩圆形, 长 10—15 厘米, 宽 4—5.5 厘米, 先端尖锐, 基部楔形; 上面绿色, 发亮, 初时被柔毛, 以后变秃净, 下面有褐色星状绒毛; 侧脉 5—7 对, 在上面略下陷, 在下面突起, 网脉在上下两面均能见; 全缘或靠近先端有 1—2 个小锯齿; 叶柄长 1—1.5 厘米, 密被绒毛, 托叶早落。花未见。总状花序腋生, 或生于具有 2—3 片叶子的侧枝顶端, 长 3—5 厘米, 花序轴有褐色绒毛。蒴果长卵形, 长 1.5—1.7 厘米, 外侧密生绒毛, 宿存花柱长 3 毫米, 2 片裂开, 每片 2 浅裂, 基部无宿存萼筒。种子褐色, 发亮, 长 8—9 毫米。果梗 2—4 毫米。

分布于贵州, 见于独山及八寨。

嫩枝被毛, 叶矩圆形, 长达 15 厘米, 背面有柔毛, 蒴果长 1.6 厘米, 有宿存花柱。它曾被认为和闽粤蚊母树 *D. chungii* 是同一个种 (Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. 8: 142, 1932), 但后者的叶片较短, 老叶往往秃净无毛, 蒴果亦稍短小。

9. 窄叶蚊母树

Distylium dunnianum Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 11: 67, 1912; 张宏达, 中山大学学报, 1961, 第 4 期, 56 页。

Myrica seguini Lévl. l. c. 12: 537, 1913. *Myrica rapaneoides* Lévl. in Bull. Acad. Inst. Geogr. Bot. 24: 146, 1914. *Distylium chinense* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 12: 280, 1931; Hand.-Mzt. Symb. Sin. 7: 238, 1929, non Diels.

Distylium lanceolatum Chun ex Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. 10: 124, 1936, in nota; Walker, l. c. *Distylium buxifolium* Walker, l. c., pro parte, non Merr.

常绿灌木或小乔木, 高 2—6 米; 嫩枝略有棱, 被褐色星状柔毛; 老枝圆筒形, 秃净无毛, 干后灰褐色; 芽体有褐色星状绒毛。叶革质, 狭长披针形, 长 6—10 厘米, 宽 1.2—2.2 厘米, 先端尖锐, 基部圆形或广楔形, 上面绿色、无毛, 下面秃净, 或在脉腋间有簇生毛丛; 侧脉 6—9 对, 干后在上面下陷, 在下面突起, 网脉在上面不明显, 在下面能见, 边缘无锯齿, 叶柄长 5—8 毫米, 有星状绒毛。花未见。果序总状, 腋生, 长 3—5 厘米; 蒴果卵圆形, 长约 1 厘米, 有褐色星状绒毛, 先端尖, 宿存花柱极短, 干后裂开为 4 片。种子长卵形, 长 4—5 毫米, 发亮, 淡褐色。

分布于广西和贵州, 并到达滇东富宁。

小枝有绒毛, 叶狭长披针形, 长 6—10 厘米, 先端尖锐, 基部略圆, 叶柄长 5—8 毫米。它和几个近缘种容易混淆, 曾分别被并入中华蚊母树 *D. chinense* 及小叶蚊母树 *D. buxifolium* (见上开列文献)。实际上, 后二者除了叶子较短小之外, 缺乏明显的叶柄, 叶的基部收窄而下延, 叶片和叶柄缺乏明显的界限。

10. 中华蚊母树