

房花序密集,具长总梗;苞片线形,长2—4毫米,具灰色柔毛;花两性,直径约7毫米;萼筒外面无毛或有短柔毛,宽陀螺状;萼片三角卵形,内面先端有白色短柔毛;花瓣深胭脂红色,圆形,长于萼片约一倍半;雄蕊20,花药褐紫色,几与花瓣等长。蓇葖果无毛,花柱长1.5毫米,柱头头状。

产云南、四川、西藏,海拔2800米。模式标本采自云南瑞丽江及怒江分水岭。

本种和粉花绣线菊 *S. japonica* L. f. 的原变种近似,惟后者叶片基部多楔形,边缘锯齿较尖锐,叶柄较短,雄蕊长于花瓣,蓇葖果在腹缝上常具柔毛,易于区别。

本种雄蕊一般和花瓣等长,但在西藏标本中(亚东,张经炜 2507),雄蕊短而细,有演化为雌花的趋势,这种由两性花简化为单性花的现象,在本属仅见于藏南绣线菊 *S. bella* Sims。

5. 藏南绣线菊 美丽绣线菊(经济植物手册)

Spiraea bella Sims in Curtis's Bot. Mag. **50**:t. 2426. 1823; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **2**:324. 1879; Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. **6**:263. 1912; W. W. Smith in Rec. Bot. Surv. India **4**:364. 1913; Breslau in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**:404. 1922; Marquand in Journ. Linn. Soc. Bot. **48**:174. 1929; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:454. 1933.

落叶灌木,高达2米;小枝稍具棱角,被短柔毛或几无毛,黄褐色至红褐色;冬芽小,具数枚鳞片。叶片卵形,椭圆卵形至卵状披针形,长2—4厘米,宽1—2厘米,先端急尖,基部宽楔形至圆形,边缘自基部1/3以上有锐锯齿或重锯齿,上面无毛,稀微具毛,下面沿叶脉具短柔毛或近无毛;叶柄长2—5毫米。复伞房花序顶生,多花;花梗具短柔毛,长5—8毫米;苞片椭圆披针形,微具毛;花趋向单性雌雄异株,淡红色稀白色,直径5—7毫米;萼筒钟状,外面稍具短柔毛;萼片三角卵形,几无毛;花瓣近圆形,长于萼片;雄蕊20,在雌花中雄蕊退化,较花瓣短,在雄花中雄蕊较花瓣长;花盘圆环形,具10个裂片;子房在雌花中发达,具短柔毛,在雄花中退化。蓇葖果开张,沿腹缝线微被短柔毛,花柱倾斜开展,萼片反折。

产云南西北部、西藏东南部。生于山坡灌丛中或杂木林下,海拔2400—3600米。印度、不丹、尼泊尔有分布。

本种和紫花绣线菊 *Spiraea purpurea* Hand.-Mazz. 近似,区别在于后者花两性,紫红色,叶片较大。

6. 华北绣线菊(东北木本植物图志) 弗氏绣线菊(经济植物手册)

Spiraea fritschiana Schneid. in Bull. Herb. Boiss. sér. 2. **5**:347. 1905 & Ill.