

S. miyabei Koidz. var. **glabrata** Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:454. 1913.

本变种花序和叶片均无毛,叶片长5—7厘米,宽2—3.5厘米,花序直径7—8厘米。

产湖北、陕西。生于山坡沟边或杂木林内,海拔1000—2000米。模式标本采自湖北兴山。

长蕊绣线菊毛叶变种

S. miyabei Koidz. var. **pilosula** Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:455. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:454. 1933.

叶片基部楔形,上面有稀疏柔毛,下面密被柔毛,边缘锯齿深,花萼外被稀疏柔毛。

产湖北、四川、云南。生山地林边,海拔1000—1600米。模式标本采自湖北兴山。

长蕊绣线菊细叶变种

S. miyabei Koidz. var. **tenuifolia** Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:455. 1913.

叶片细长,长7厘米,宽3.5厘米,基部楔形,下面粉绿色,叶柄细长达1厘米。

产四川。模式标本采自峨眉山。

系2. 翠蓝茶系 Ser. Henryanae Yü, 植物分类学报 8:214. 1963.

本系有下列7种:

8. 川滇绣线菊

Spiraea schneideriana Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:449. 1913.

川滇绣线菊(原变种) 图版 2:1—4

S. schneideriana Rehd. var. **schneideriana**

灌木,高1—2米;枝条开展,小枝有稜角,幼时被细长柔毛,暗褐色,以后毛逐渐脱落,老枝灰褐色,无毛;冬芽卵形,先端稍钝或急尖,具数枚褐色鳞片,幼时外面被柔毛。叶片卵形至卵状长圆形,长8—15毫米,宽5—7毫米,先端圆钝或微急尖,基部楔形至圆形,全缘,稀先端有少数锯齿,两面无毛或沿叶缘有细长柔毛,叶脉不显著,有时基部具3脉;叶柄长1—2毫米,常无毛。复伞房花序着生在侧生小枝顶端,外被短柔毛或近于无毛,具多数花朵;花梗长4—9毫米;苞片披针形,先端急尖,基部楔形,全缘,微被柔毛;花直径5—6毫米;萼筒钟状,内外两面均被细柔毛;萼片卵状三角形,先端急尖,外面近无毛,内面具短柔毛;花瓣圆形至卵形,先端圆钝或微凹,白