

稜角,冬芽仅具2枚鳞片,也可区别。作者尚未见到标本,附志于此,留待考订。

11. 鄂西绣线菊 魏忌绣线菊(经济植物手册) 图版 2:8—12

Spiraea veitchii Hemsl. in Gard. Chron. ser. 3. **33**:258. 1903; Bean in Curtis's Bot. Mag. **137**: t. 8383. 1911; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**:449. 1913 & in Journ. Arn. Arb. **13**:301. 1932; 陈嵘,中国树木分类学 489. 图 383. 1937; 中国高等植物图鉴 **2**:174. 图 2077. 1972.——*S. atemnophylla* Lévl. in Bull. Géogr. Bot. **25**:44. 1915; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 244. 1917.

灌木,高达4米;枝条细长,呈拱形弯曲,幼时被短柔毛,红褐色,稍有稜角,老时无毛,圆柱形,灰褐色或暗红色;冬芽小,卵形,先端急尖或圆钝,外被短柔毛,有数枚外露鳞片。叶片长圆形、椭圆形或倒卵形,长1.5—3厘米,宽7—10毫米,先端圆钝或有微尖,基部楔形,全缘,上面绿色,通常无毛,下面灰绿色,具白霜,有时被极细短柔毛,具不明显的羽状脉;叶柄长约2毫米,具细短柔毛。复伞房花序着生在侧生小枝顶端,直径4.5—6厘米,花小而密集,密被极细短柔毛;花梗短,长约3—4毫米;花直径约4毫米;萼筒钟状,内外两面被细短柔毛;萼片三角形,先端急尖,内面先端有细柔毛;花瓣卵形或近圆形,先端圆钝,长1—1.5毫米,宽1—2毫米;雄蕊约20,稍长于花瓣;花盘约有10个裂片,排列成环形,裂片先端常稍凹陷;子房几无毛,花柱短于雄蕊。蓇葖果小,开张,无毛,花柱生于背部顶端,倾斜开展,萼片直立。花期5—7月,果期7—10月。

产陕西、湖北、四川、云南。生于山坡草地或灌木丛中,海拔2000—3600米。模式标本采自湖北西部。

栽培供观赏,花朵虽小但花序密集,在绣线菊中为珍品。

12. 翠蓝绣线菊 翠蓝茶(亨利氏中国植物名录),亨利绣线菊(经济植物手册)

Spiraea henryi Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:225. t. 6. 1887; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**:469. f. 292 w-w³. 1905; Prain in Curtis's Bot. Mag. **135**: t. 8270. 1909; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**:447. 1913; 陈嵘,中国树木分类学 490. 图 385. 1937; 中国高等植物图鉴 **2**:174. 图 2078. 1972.

翠蓝绣线菊(原变种) 图版 3:5—10

S. henryi Hemsl. var. *henryi*

灌木,高1—3米;枝条开展,小枝圆柱形,幼时被短柔毛,以后脱落近无毛;冬芽卵形,先端通常圆钝,稀急尖,有数枚外露鳞片,幼时棕褐色,被短柔毛。叶片椭圆形、椭圆状长圆形或倒卵状长圆形,长2—7厘米,宽0.8—2.3厘米,先端急尖或稍圆钝,