

产西藏南部及东南部,生河岸山坡灌丛中,海拔 3000—4000 米。尼泊尔、印度北部和锡金等地山区也有分布。

楔叶绣线菊粉叶变种

S. canescens D. Don var. **glaucophylla** Franch. Pl. Delav. 200. 1889.——*S. canescens* D. Don var. *myrtifolia* Zabel, Strauch. Spiräen 56. 1893; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:469. 1905.——*S. canescens* D. Don var. *sulphurea* Batal. in Acta Hort. Petrop. 14:321. 1895.

叶片倒卵形或长圆形,全缘或先端具不显明 3 裂,无毛,下面带粉绿色,萼筒无毛或具稀疏柔毛。

产云南西北部、四川西部,海拔 2500—3000 米。模式标本采自云南大理苍山。

楔叶绣线菊窄叶变种

S. canescens D. Don var. **oblanceolata** Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:450. 1913.

叶片倒卵状披针形或倒披针形,全缘或稀先端有少数锯齿,下面微被短柔毛或近无毛,萼筒具稀疏柔毛。

产四川西部。生于溪流旁,海拔 2300—3000 米。模式标本采自小金。

21. 拱枝绣线菊

Spiraea arcuata Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:325. 1878; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:466. f. 292 i-i³. 1905; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:451. 1933.——*Spiraea canescens* var. *glabra* Hook. f. & Thoms. Fl. Brit. Ind. 2:325. 1878.

小灌木;枝粗壮,拱形弯曲,老时无毛,暗褐色,具光泽,稍有稜角;冬芽具 2 枚褐色外露鳞片。叶片长椭圆形至倒卵形,长 8—12 毫米,宽 3—5 毫米,先端圆钝,具 3—8 锯齿或先端浅裂,稀全缘和急尖,基部渐狭成柄,无毛或近无毛。复伞房花序密具多花,总花梗和花梗微被柔毛;花红色,直径 6—8 毫米;花萼外被柔毛,萼筒陀螺状;雄蕊稍短于花瓣或几与花瓣等长;花盘宽锯齿状。蓇葖果无毛,稀仅沿腹缝微具柔毛,花柱顶生于背部,倾斜开展,具反折萼片。

产云南、四川、西藏。生于亚高山多石地带,海拔 3000—4200 米。印度、锡金也有分布。

此种和楔叶绣线菊 *Spiraea canescens* D. Don 很相近,区别在于此种较粗壮,无毛,叶柄稍长,花较大,红色,果实无毛或仅腹缝微有毛。

22. 毛果绣线菊(东北木本植物图志) 石蚌树(辽东土名) 图版 3:18—19