

栽培。日本也有记录。

庭园栽培供观赏。花序密集,花色洁白,早春盛开如积雪,甚美丽。常见栽培品种有重瓣麻叶绣线菊 *S. cantoniensis* Lour. var. *lanceata* Zabel, 叶片披针形,仅先端有少数稀疏细锯齿,花重瓣。枝叶治疥癣。

麻叶绣线菊毛萼变种

S. cantoniensis Lour. var. *pilosa* Yü, 植物分类学报 8:216. 1963.

本变种与原变种区别在其花萼外面密被柔毛,花梗和总花梗也被稀疏柔毛。

产湖南、广东。模式标本采自湖南慈利。

25. 菱叶绣线菊 范氏绣线菊(经济植物手册) 图版 4:9—10

Spiraea vanhouttei (Briot) Zabel in Garten-Zeit. (Wittmack) 3:496. 1884.——

S. aquilegifolia var. *vanhouttei* Briot in Rev. Hort. 1866:269. 1866; Carr in Rev. Hort. 1876:260. 1876.

灌木,高达2米;小枝拱形弯曲,红褐色,幼时无毛;冬芽很小,卵形,先端圆钝,无毛,有数枚鳞片。叶片菱状卵形至菱状倒卵形,长1.5—3.5厘米,宽0.9—1.8厘米,先端急尖,通常3—5裂,基部楔形,边缘有缺刻状重锯齿,两面无毛,上面暗绿色,下面浅蓝灰色,具不显著3脉或羽状脉;叶柄长3—5毫米,无毛。伞形花序具总梗,有多数花朵,基部具数枚叶片;花梗长7—12毫米,无毛;苞片线形,无毛;萼筒和萼片外面均无毛;花瓣近圆形,先端钝,长与宽各约3—4毫米,白色;雄蕊20—22,部分雄蕊不发育,长约花瓣之1/2或1/3;花盘圆环形,具大小不等的裂片,子房无毛。蓇葖果稍开张,花柱近直立,萼片直立开张。花期5—6月。

此种是麻叶绣线菊 *S. cantoniensis* Lour. 和三裂绣线菊 *S. trilobata* L. 的杂交种,栽培供观赏用。见于山东、江苏、广东、广西、四川。

26. 三裂绣线菊(青岛木本植物名录) 石棒子、礪子(河北土名),三桠绣球(山东土名),团叶绣球(中国树木分类学),三裂叶绣线菊(经济植物手册)

Spiraea trilobata L. Mant. Pl. 2:244. 1771; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:465.

图版 4: 1—4. 土庄绣线菊 *Spiraea pubescens* Turcz. var. *pubescens*, 1. 花枝×1; 2. 花纵剖面×5; 3. 果实×5; 4. 叶片下面×1。5—8. 三裂绣线菊 *Spiraea trilobata* L. var. *trilobata*, 5. 花纵剖面×5; 6. 果实×5; 7—8. 叶片×1。9—10. 菱叶绣线菊 *Spiraea vanhouttei* (Briot) Zabel, 9—10. 叶片×1。11—15. 金州绣线菊 *Spiraea nishimurae* Kitag., 11. 花纵剖面×5; 12—15. 叶片×1。16—17. 麻叶绣线菊 *Spiraea cantoniensis* Lour. var. *cantoniensis*, 16—17. 叶片×1。18—21. 绣球绣线菊 *Spiraea blumei* G. Don var. *blumei*, 18—21. 叶片×1。(张泰利绘)

