

27. 绣球绣线菊(东北木本植物图志) 珍珠绣球(中国树木分类学), 补氏绣线菊(经济植物手册), 绣球(江苏土名), 珍珠梅(四川土名), 碎米桠(贵州土名)

Spiraea blumei G. Don, Gen. Hist. Dichlam. Pl. 2:518. 1832; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:465. 1905; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:446. 1913 & in Journ. Arn. Arb. 5:170. 1924 & 8:117. 1927; 陈嵘, 中国树木分类学 488. 1937; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 284. 图版 100:194. 1955; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 373. f. 603. 1959; 北京师范大学, 北京植物志上册 381. 图 328. 1962; 中国高等植物图鉴 2:176. 图 2082. 1972.——*S. obtusa* Nakai in Bot. Mag. Tokyo 31:97. 1917.——*S. trilobata* auct. non L. 1771: Nakai, Fl. Sylv. Kor. 4:22. t. 11. 1916.

绣球绣线菊(原变种) 图版 4:18—21

S. blumei G. Don var. **blumei**

灌木, 高 1—2 米; 小枝细, 开张, 稍弯曲, 深红褐色或暗灰褐色, 无毛; 冬芽小, 卵形, 先端急尖或圆钝, 无毛, 有数个外露鳞片。叶片菱状卵形至倒卵形, 长 2—3.5 厘米, 宽 1—1.8 厘米, 先端圆钝或微尖, 基部楔形, 边缘自近中部以上有少数圆钝缺刻状锯齿或 3—5 浅裂, 两面无毛, 下面浅蓝绿色, 基部具有不显明的 3 脉或羽状脉。伞形花序有总梗, 无毛, 具花 10 至 25 朵; 花梗长 6—10 毫米, 无毛; 苞片披针形, 无毛; 花直径 5—8 毫米; 萼筒钟状, 外面无毛, 内面具短柔毛; 萼片三角形或卵状三角形, 先端急尖或短渐尖, 内面疏生短柔毛; 花瓣宽倒卵形, 先端微凹, 长 2—3.5 毫米, 宽几与长相等, 白色; 雄蕊 18—20, 较花瓣短; 花盘由 8—10 个较薄的裂片组成, 裂片先端有时微凹; 子房无毛或仅在腹部微具短柔毛, 花柱短于雄蕊。蓇葖果较直立, 无毛, 花柱位于背部先端, 倾斜开展, 萼片直立。 花期 4—6 月, 果期 8—10 月。

产辽宁、内蒙古、河北、河南、山西、陕西、甘肃、湖北、江西、山东、江苏、浙江、安徽、四川、广东、广西、福建。生于向阳山坡、杂木林内或路旁, 海拔 500—2000 米。日本和朝鲜也有分布。

观赏灌木, 庭园中习见栽培。叶可代茶, 根、果供药用。

绣球绣线菊毛果变种

S. blumei G. Don var. **pubicarpa** Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China bot. ser. 10:130. 1936.

子房和蓇葖果被短柔毛, 与原变种易于区别。

产陕西、浙江。模式标本采自浙江天目山。