

绣球绣线菊宽瓣变种

S. blumei G. Don var. **latipetala** Hemsl in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:224. 1887.

本变种花梗及萼筒具细短柔毛,花瓣宽大。

产浙江、广东。模式标本采自浙江宁波。

绣球绣线菊小叶变种

S. blumei G. Don var. **microphylla** Rehd. in Journ. Arn. Arb. **9**:55. 1928.

叶片小,宽卵形,长 6—9 毫米,边缘具波状锯齿,三出脉明显。伞形花序小。

产甘肃。生阳坡燥地,多石灰岩沟谷。模式标本采自白龙江。

28. **土庄绣线菊**(东北木本植物图志) 土庄花、石葶子、小叶石棒子(河南土名), 蚂蚱腿(东北木本植物图志),柔毛绣线菊(经济植物手册)

Spiraea pubescens Turcz. in Bull. Soc. Nat. Moscou **5**:190. 1832; Nakai, Fl. Sylv. Kor. **4**:22. t. 10. 1916; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5**:169. 1924 & **13**:300. 1932; 陈嵘, 中国树木分类学 488. 1937; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 284. 图版 100:195. 1955; 北京师范大学, 北京植物志上册 382. 1962; 中国高等植物图鉴 **2**:177. 图 2083. 1972.——*S. laucheana* Koehne in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **1899** (8):56. 1899. nom. nud.; Koehne ex Pojark. in Fl. URSS **9**:301. 1939. pro syn.——*S. ouensanensis* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **7**:197. 1909.

土庄绣线菊(原变种) 图版 4:1—4

S. pubescens Turcz. var. **pubescens**

灌木,高 1—2 米;小枝开展,稍弯曲,嫩时被短柔毛,褐黄色,老时无毛,灰褐色;冬芽卵形或近球形,先端急尖或圆钝,具短柔毛,外被数个鳞片。叶片菱状卵形至椭圆形,长 2—4.5 厘米,宽 1.3—2.5 厘米,先端急尖,基部宽楔形,边缘自中部以上有深刻锯齿,有时 3 裂,上面有稀疏柔毛,下面被灰色短柔毛;叶柄长 2—4 毫米,被短柔毛。伞形花序具总梗,有花 15—20 朵;花梗长 7—12 毫米,无毛;苞片线形,被短柔毛;花直径 5—7 毫米;萼筒钟状,外面无毛,内面有灰白色短柔毛;萼片卵状三角形,先端急尖,内面疏生短柔毛;花瓣卵形、宽倒卵形或近圆形,先端圆钝或微凹,长与宽各 2—3 毫米,白色;雄蕊 25—30, 约与花瓣等长;花盘圆环形,具 10 个裂片,裂片先端稍凹陷;子房无毛或仅在腹部及基部有短柔毛,花柱短于雄蕊。蓇葖果开张,仅在腹缝微被短柔毛,花柱顶生,稍倾斜开展或几直立,多数具直立萼片。花期 5—6 月,果期 7—8 月。