

三角形或卵状三角形,先端急尖,内外两面均具短柔毛;花瓣宽倒卵形,稀近圆形,长2.5—3毫米,宽3—4毫米,白色;雄蕊18—20,短于花瓣;花盘具10个肥厚的裂片,裂片先端微凹;子房微具短柔毛,花柱短于雄蕊。蓇葖果稍开张,具稀疏短柔毛,花柱顶生于背部,倾斜开展,常具直立萼片。花期5月,果期7—8月。

产甘肃、陕西、河北、河南、山西、湖北、湖南、江西、浙江、四川。生于山坡或石岩上,海拔600—1700米。模式标本采自湖北宜昌。

本种与中华绣线菊 *S. chinensis* Maxim. 很相似,惟后者叶片下面密被黄色绒毛,叶边锯齿较密而尖锐,可以区别。

疏毛绣线菊圆叶变种

S. hirsuta (Hemsl.) Schneid. var. ***rotundifolia*** (Hemsl.) Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:445. 1913 & in Journ. Arn. Arb. 8:117. 1927.——*S. blumei* var. *rotundifolia* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23:224. 1887.——*S. maximowicziana* Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:461. 1905.

叶片卵形,基部宽楔形至圆形。

产陕西、湖北、四川。模式标本采自湖北宜昌。

32. 中华绣线菊 铁黑汉条(湖北兴山土名),华绣线菊(经济植物手册)

Spiraea chinensis Maxim. in Acta Hort. Petrop. 6:193. 1879; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:444. 1913 & in Journ. Arn. Arb. 8:117. 1927; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:451. 1933; 陈嵘,中国树木分类学 488. 1937; 裴鉴等,江苏南部种子植物手册 373. 图 601. 1959; 中国高等植物图鉴 2:178. 图 2085. 1972.——*S. pubescens* auct. non Turcz. 1832; Lindl. in Journ. Roy. Hort. Soc. Lond. 2:157. 1847 & in Bot. Reg. 33: t. 38. 1847.——*S. dasyantha* auct. non Bge. 1835; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23:224. 1887.

中华绣线菊(原变种)

S. chinensis Maxim. var. ***chinensis***

灌木,高1.5—3米;小枝呈拱形弯曲,红褐色,幼时被黄色绒毛,有时无毛;冬芽卵形,先端急尖,有数枚鳞片,外被柔毛。叶片菱状卵形至倒卵形,长2.5—6厘米,宽1.5—3厘米,先端急尖或圆钝,基部宽楔形或圆形,边缘有缺刻状粗锯齿,或具不显明3裂,上面暗绿色,被短柔毛,脉纹深陷,下面密被黄色绒毛,脉纹突起;叶柄长4—10毫米,被短绒毛。伞形花序具花16—25朵;花梗长5—10毫米,具短绒毛;苞片线形,被短柔毛;花直径3—4毫米;萼筒钟状,外面有稀疏柔毛,内面密被柔毛;萼片卵状