

41. 细枝绣线菊

Spiraea myrtilloides Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:440. 1913; 中国高等植物图鉴 2:180. 图 2089. 1972.——*S. virgata* Franch. Pl. Delav. 199. 1890; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 20:93. 1939.——*S. canescens* D. Don var. *glaucophylla* Franch., Pl. Delavay 200. 1890.——*S. microphylla* Lévl. in Bull. Acad. Géog. Bot. 25:44. 1915 & Cat. Pl. Yunnan 244. 1917; Rehder in Journ. Arn. Arb. 13: 300. 1932. pro syn. sub *S. ovalis* Rehder.

灌木,高2—3米;枝条直立或开张,嫩时有稜角,暗红褐色,近无毛,老时暗褐色或暗灰褐色;冬芽卵形,先端急尖,无毛或近于无毛,具数枚褐色鳞片。叶片卵形至倒卵状长圆形,长6—15毫米,宽4—7毫米,先端圆钝,基部楔形,全缘,稀先端有3至数个钝锯齿,下面浅绿色,具稀疏短柔毛或无毛,有不显明的羽状脉,基部3脉较显明;叶柄长1—2毫米,无毛或近无毛。伞形总状花序具花7—20朵;花梗长3—6毫米,无毛或具稀疏短柔毛;苞片线形或披针形,无毛;花直径5—6毫米;花萼外面无毛或近无毛,内面具短柔毛;萼筒钟状;萼片三角形,先端急尖;花瓣近圆形,先端圆钝,长与宽各约2—3毫米,白色;雄蕊20,与花瓣等长;花盘圆环形,具10个裂片;子房微具短柔毛,花柱短于雄蕊。蓇葖果直立开张,仅沿腹缝有短柔毛或无毛,花柱顶生,倾斜开展,萼片直立或开张。花期6—7月,果期8—9月。

产湖北、甘肃、四川、云南。生于山坡、山谷或杂木林边,海拔1500—3100米。模式标本采自四川康定。

本种近似高山绣线菊 *S. alpina* Pall., 惟后者叶片较窄,多呈线状披针形,先端急尖,稀圆钝,全缘,下面灰绿色,具粉霜,花序总梗很短或近于无梗,可以区别。又本种与前述之川滇绣线菊 *Spiraea schneideriana* Rehd. 在枝叶形态上极为相似,惟川滇绣线菊的花序为复伞房花序,花数较多,可与本种区别。

42. 窄叶绣线菊(东北木本植物图志)

Spiraea dahurica Maxim. in Acta Hort. Petrop. 6:190. 1879; Pojark. in Fl. URSS 9:297. t. 17:11. 1939; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 285. 图版 101:196. 1955.——*S. alpina* var. *dahurica* Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Sci. St. Pétersb.

图版 6: 1—7. 欧亚绣线菊 *Spiraea media* Schmidt, 1. 果枝×1; 2—4. 叶片×1; 5. 花纵剖面×5; 6. 果实×5; 7. 冬芽×5。 8—11. 高山绣线菊 *Spiraea alpina* Pall., 8. 花枝×1; 9—10. 叶片×1; 11. 果实×5。 12—17. 平卧绣线菊 *Spiraea prostrata* Maxim., 12. 果枝×1; 13. 小枝×1; 14—16. 叶片×1; 17. 果实×5。(吴彰桦绘)