

芽长卵形,先端渐尖,具2枚外露鳞片。叶片宽卵形,长2—4.5厘米,宽1—3厘米,先端急尖,基部圆形或宽楔形,边缘有细锐单锯齿和重锯齿,不孕枝上的叶片有时具缺刻状重锯齿,下面脉腋间簇生短柔毛;叶柄长4—7毫米,无毛或具极稀疏柔毛。花序伞形总状,直径2—2.5厘米,无毛,有花5—12朵;花梗长4—8毫米;苞片线形,无毛,早落;花直径6—9毫米;花萼外面无毛,萼筒广钟状,内面具短柔毛;萼片卵状三角形,先端急尖,内面疏生短柔毛;花瓣宽卵形或近圆形,先端钝,长2.5—3.5毫米,宽2—3毫米,白色;雄蕊35—50,长于花瓣;花盘为微波状圆环形;子房在腹部微具短柔毛,花柱短于雄蕊。蓇葖果直立,具伏生短柔毛,花柱直立在蓇葖果腹面先端,萼片常反折。花期5—6月,果期7—9月。

产河北、黑龙江、吉林、辽宁、新疆。生于山坡杂木林内或林间隙地,海拔600—950米。苏联、朝鲜、日本均有分布。

栽培供观赏,又为蜜源植物。

A. Pojarkova 将远东的石蚕叶绣线菊另立为一种,名为乌苏里绣线菊 *S. ussuriensis* Pojark., 嫩枝颜色从浅黄到褐色,叶片基部从楔形到圆形,花序从稀疏的伞形总状到密集伞形总状而近于伞形,二者很难区分,故合并为一种。

系4.尖芽系 Ser. Gemmatae Yü, 植物分类学报 8:215. 1963.

本系有下列2种:

49. 蒙古绣线菊

Spiraea mongolica Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 27:467. 1881 (Mél. Biol. 11:216. 1881); Koehne, Deuts. Dendr. 212. 1893; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 5:168. 1924; 中国高等植物图鉴 2:182. 图 2094. 1972. — *S. crenifolia* γ *mongolica* Maxim. in Acta Hort. Petrop. 6:181. 1879. — *S. gemmata* Zabel, Strauch. Spiraen 23. 1893; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:466. f. 290 f-g. 1905; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:441. 1913 & in Journ. Arn. Arb. 9:55. 1928.

蒙古绣线菊(原变种) 图版 7:13—18

图版 7: 1—4. 毛枝绣线菊 *Spiraea martinii* Lévl. var. *martinii*, 1. 花枝×1; 2. 花纵剖面×3; 3. 果实×5; 4. 冬芽×5。 5—12. 毛叶绣线菊 *Spiraea mollifolia* Rehd., 5. 花枝×1; 6—9. 叶片×1; 10. 花纵剖面×5; 11. 果实×5; 12. 冬芽×5。 13—18. 蒙古绣线菊 *Spiraea mongolica* Maxim. var. *mongolica*, 13. 果枝×1; 14—15. 叶片×1; 16. 花纵剖面×5; 17. 果实×5; 18. 冬芽×5。(吴彰桦绘)