

本种与粉叶绣线菊 *S. compsophylla* Hand.-Mazz. 相近似, 惟后者不孕枝上的叶片扇形, 先端 3—5 裂, 花瓣近圆形, 与萼片近等长, 雄蕊稍长于花瓣。又可与毛枝绣线菊 *S. martinii* Lévl. 比较, 后者小枝密被绒毛, 叶片上面无毛或微被短柔毛, 下面密被短柔毛, 是其异点。

54. 毛枝绣线菊

Spiraea martinii Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. **9**:321. 1911 & Cat. Pl. Yunnan 244. 1917; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **1**:258. 1920 & **13**:300. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:450. 1933; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **17**:334. 1936; 中国高等植物图鉴 **2**:184. 图 2098. 1972.——*S. fulvescens* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**:439. 1913.

毛枝绣线菊(原变种) 图版 7:1—5

S. martinii Lévl. var. *martinii*

灌木, 高 1.5—2.5 米; 小枝圆柱形, 幼时黄褐色, 密被绒毛, 老时呈棕褐色; 冬芽小, 卵形, 具数枚鳞片, 外被短柔毛。叶片椭圆形至倒卵形, 大小不等, 较大者长 8—17 毫米, 宽 5—10 毫米, 较小者长 2—5 毫米, 宽 2—3 毫米, 先端急尖或圆钝, 有时常 3 浅裂, 边缘有 3—5 钝锯齿, 基部宽楔形, 上面无毛或微被短柔毛, 暗绿色, 下面密被短柔毛, 灰白色, 具羽状脉或基部有显著 3 脉; 叶柄极短, 长 1—2 毫米, 幼时被黄色柔毛。伞形花序密集在小枝上, 无总梗, 具花 5—18 朵, 基部簇生数枚大小不等的叶片; 花梗长 5—9 毫米, 无毛; 苞片披针形, 微被短柔毛或无毛; 花直径 5—6 毫米; 萼筒钟状, 外面无毛, 内面被短柔毛; 萼片卵状三角形或三角形, 先端急尖, 内面微被短柔毛; 花瓣近圆形或倒卵形, 先端圆钝, 长 3—4 毫米, 宽几与长相等, 白色; 雄蕊 20—25, 比花瓣短; 花盘明显, 具 10 个发达的裂片, 排列成圆环形; 子房微被短柔毛, 花柱比雄蕊短。蓇葖果开张, 仅沿腹缝稍具短柔毛, 花柱近顶生, 稍倾斜或直立开展, 具直立萼片。花期 2—3 月, 果期 4—5 月。

产云南、四川、广西、贵州。生于干燥坡地、山谷、路旁及灌木丛中, 海拔 1450—2050 米。模式标本采自云南昆明。

毛枝绣线菊绒毛叶变种

S. martinii Lévl. var. *tomentosa* Yü, 植物分类学报 **8**:217. 1963.

小枝和叶片两面密被黄色绒毛。

产云南东南部。生于路旁, 海拔 2000 米。模式标本采自建水。

毛枝绣线菊长梗变种

S. martinii Lévl. var. *pubescens* Yü, 植物分类学报 **8**:217. 1963.