

米,花梗长约2毫米,总花梗和花梗均被稀疏长柔毛;苞片小,披针形,先端钝,全缘,长约2毫米,微被柔毛;花直径5—8毫米;雄花萼筒浅钟状,外被稀疏长柔毛;萼片三角至宽三角形,先端急尖,全缘,内外两面均有稀疏柔毛;花瓣匙形,先端钝,浅黄白色;雄蕊20—25,稍长于花瓣,着生在萼筒边缘;花盘环状,具10裂片;心皮5,在雄花中不发育。蓇葖果5,直立,腹缝有柔毛,褐色,光亮。花期6月;果期8月。

产云南西北部。生于高山溪岸、潮湿多石地,海拔3500—4000米。模式标本采自丽江。

### 3. 假升麻属\*——*Aruncus* Adans.

Adans. Fam. Pl. 2:259. 1763; Focke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(3):16. 1888; Hutch. Gen. Flow. Pl. 1:183. 1964.——*Spiraea* L. Sp. Pl. 489. 1753. p. p. & Gen. Pl. ed. 5. 216. no. 554. 1754. p. p.; Benth. & Hook. f. Gen. Pl. 1:611. 1865. p. p.——*Spiraea* sect. *Aruncus* Ser. in DC. Prodr. 2:545. 1825.

多年生草本,根茎粗大。叶互生,大型,一至三回羽状复叶,稀掌状复叶,小叶边缘有锯齿,不具托叶。花单性,雌雄异株,成大型穗状圆锥花序,无梗或近于无梗;萼筒杯状,5裂;花瓣5,白色;雄蕊15—30,花丝细长,约为花瓣的1倍,雌花中具有短花丝和不发育的花药;心皮3—4,稀5—8,与萼片互生,子房1室,雄花中有退化雌蕊。蓇葖果沿腹缝开裂,通常具棍棒状种子2,有少量胚乳。

本属的模式种:假升麻 *Spiraea aruncus* L. = *Aruncus sylvester* Kostel.

本属约有6种,分布于北半球冷温带。中国产2种。

花序大,花期长,花朵密集,可供栽培和观赏。

### 假升麻属分种检索表

1. 高大草本,高1—3米,具二至三回羽状复叶,小叶片菱状卵形至长椭圆形;花序长大,长10—40厘米,花朵排列稀疏。……………1. 假升麻 *A. sylvester* Kostel.
1. 中大草本,高30—70厘米,多具三出复叶,小叶片近圆形至宽卵形;花序较短,长5—25厘米,花朵在花轴上密集。……………2. 贡山假升麻 *A. gombalanus* Hand.-Mazz.

1. 假升麻(中国种子植物科属辞典) 椴棠升麻(东北植物检索表) 图版10:

\* 属的异名: 椴棠升麻属(植物学大辞典)。