

7. 心皮 1, 子房顶端有毛或全部无毛。…………… 3. 粉花绣线梅 *N. rubiflora* D. Don
7. 心皮 1—5, 子房外面全部被柔毛。…………… 4. 川康绣线梅 *N. affinis* Hemsl.
6. 花序长 4—9 厘米, 有花 10—25 朵; 叶片呈羽状分裂, 基部多圆形; 心皮 1, 子房顶端及腹缝被柔毛。…………… 7. 东北绣线梅 *N. uekii* Nakai
4. 萼筒外面无毛, 小枝、叶柄和总花梗有红色腺毛; 花序长 3.5—4.5 厘米, 有花 4—6 (—12) 朵; 叶片分裂深; 心皮 1, 含 7—9 胚珠, 子房顶端有毛。……………
- …………… 5. 疏花绣线梅 *N. sparsiflora* Rehd.
3. 萼筒圆筒状, 长大于宽。
8. 萼筒外面无毛, 子房无毛或仅先端具毛。
9. 小枝、叶柄及叶片近于无毛, 叶片分裂较浅, 花梗长 3—10 毫米, 萼筒长 10—12 毫米, 花瓣淡粉色。…………… 8. 中华绣线梅 *N. sinensis* Oliv.
9. 小枝、叶柄及叶脉下面密被柔毛, 叶片分裂较深, 花梗长 3—4 毫米, 萼筒长 8—9 毫米, 花瓣白色或淡粉色。…………… 9. 毛叶绣线梅 *N. ribesoides* Rehd.
8. 萼筒外面密被短柔毛, 子房先端具毛; 叶片下面被柔毛或近于无毛, 叶片分裂或浅或深; 花序长 5—15 厘米, 花梗长 2—5 毫米, 萼筒长 5—6 毫米, 花瓣淡粉色。……………
- …………… 10. 西康绣线梅 *N. thibetica* Bur. & Franch.

1. 绣线梅 复序南梨(经济植物手册)

Neillia thyrsoflora D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 288. 1825; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2(Addenda):1. 1879; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:446. f. 285. 286. 1905; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:450. 1933; J. Vidal in Adansonia 3(1):153. pl. 1:3—6. 1963; Cullen in Journ. Arn. Arb. 52:144. 1971.——*Neillia virgata* Wall. Num. List. no. 7108. 1832. nom. nud.——*Spiraea thyrsoflora* K. Koch, Dendr. 1:307. 1869.

绣线梅(原变种) 图版 12:8—10

N. thyrsoflora D. Don var. ***thyrsoflora***

直立灌木, 高达 2 米; 小枝细弱, 有稜角, 红褐色, 微被柔毛或近于无毛; 冬芽卵形, 先端稍钝, 红褐色, 有 2—4 枚外露的鳞片, 边缘微被柔毛, 在开花枝上叶腋间常 2—3 芽迭生。叶片卵形至卵状椭圆形, 近花序叶片常呈卵状披针形, 长 6—8.5 厘米, 宽 4—6 厘米, 先端长渐尖, 基部圆形或近心形, 通常基部 3 深裂, 稀有不规则的 3—5 浅裂, 边缘有尖锐重锯齿, 下面沿叶脉有稀疏柔毛或近于无毛; 叶柄长 1—1.5 厘米, 微被毛或近于无毛; 托叶卵状披针形, 有稀疏锯齿, 长约 6 毫米, 两面近于无毛。顶生圆锥花序, 直径 6—15.5 厘米, 花梗长约 3 毫米, 总花梗和花梗均微被柔毛; 苞片小, 卵状披针形, 内外被毛; 花直径约 4 毫米; 萼筒钟状, 长 2—3 毫米, 外面微被短柔毛; 萼片三角形, 先端尾尖, 约与萼筒等长, 内外两面微被短柔毛; 花瓣倒卵形, 白色, 长约 2 毫米; 雄蕊 10—15, 花丝短, 着生在萼筒边缘; 子房无毛或在缝上微被毛, 内含胚珠