

近于无毛；花直径约 6 毫米；萼筒钟状，长 3—4 毫米，外面微被短柔毛，萼片三角卵形，长 2—3 毫米，先端渐尖，全缘，内外两面微被短柔毛；花瓣圆形，长宽约 4 毫米，先端微缺，并有睫毛，白色或带粉红色；雄蕊 15—20，较花瓣短，着生在萼筒边缘；子房密被长柔毛，有不显明 4 裂柱头，具 2 胚珠。蓇葖果具宿萼，外被短柔毛，内含亮褐色种子 2 颗。花期 5—7 月。

产云南、四川。生高山草地中或湿润山坡，海拔 2800—3000 米。模式标本采自云南昭通。

7. 东北绣线梅(东北木本植物图志) 图版 13:9—10

Neillia uekii Nakai in Bot. Mag. Tokyo **26**:3. 1912 & Fl. Sylv. Kor. **4**:25. t. 13. 1916; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 276. 1955; J. Vidal in Adansonia **3**(1): 158. 1963. — *N. millsii* Dunn. in Kew Bull. **1912**: 108. 1912.

直立灌木，高达 2 米；小枝细弱，有稜角，幼时微具短柔毛，红褐色，老时无毛，暗灰褐色；冬芽卵形，边缘有柔毛，紫褐色。叶片卵形至椭圆卵形，稀三角卵形，长 3—6 厘米，宽 2—4 厘米，先端长渐尖至尾尖，基部圆形至截形，边缘有重锯齿和羽状分裂，上面无毛，下面沿叶脉微具短柔毛；叶柄长 5—10 毫米，密被短柔毛；托叶膜质，卵状披针形至三角披针形，长 7—9 毫米，两面皆无毛。总状花序，具花 10—25 朵，长 4—9 厘米，微被短柔毛或星状毛，花梗长约 3—4 毫米，具腺毛与短柔毛；苞片线状披针形，长 5—7 毫米，内面微具短柔毛；花直径 5—6 毫米；萼筒钟状，长约 3—4 毫米；萼片三角形，先端渐尖，全缘，内外两面均被短柔毛，萼片约与萼筒等长或稍短；花瓣匙形，长约 4 毫米，宽约 2 毫米，先端钝，白色；雄蕊 15，略短于花瓣，着生在萼筒边缘；心皮 1—2，子房顶端及沿腹缝被柔毛，花柱顶生，直立，内含 2 胚珠。蓇葖果具宿萼，外被腺毛及短柔毛，内有 2 光亮种子。

产朝鲜。据北川政夫记载，在我国东北辽宁长甸河口附近山地亦有分布。但作者至今尚未见到国产标本，本文系根据朝鲜标本描写。

8. 中华绣线梅 华南梨(经济植物手册)

Neillia sinensis Oliv. in Hook. Ic. Pl. **16**: t. 1540. 1886; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:228. 1887; Focke in Engler & Prantl., Nat. Pflanzenfam. **3**(3):14. f. 4. 1888; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**:446. f. 285 o-p. 286 k². 1905; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**:436. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:449. 1933; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **17**:334. 1936; J. Vidal in Adansonia **3**(1):160. pl. 2:7—8. 1963; Cullen in Journ. Arn. **52**:150. 1971; 中国高等植物图鉴 **2**:189. 图 2107. 1972. — *N. glan-*

