

叶片分裂较浅,裂片先端急尖或圆钝,花梗长1—2毫米,萼筒长7—8毫米,具稀疏腺毛,萼片先端短尖。

产云南东北部,海拔2000米。模式标本采自昭通。

9. 毛叶绣线梅 图版14:12—13

Neillia ribesioides Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**:435. 1913; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:449. 1933.——*N. villosa* W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **10**:53. 1917.——*N. hypomalaca* Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:337. 1932.——*N. sinensis* var. *hypomalaca* (Rehd.) Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:449. 1933; Vidal, Adansonia **3**(1):161. 1963.——*N. sinensis* var. *ribesioides* (Rehd.) Vidal in Adansonia **3**(1):161. 1963; Cullen in Journ. Arn. Arb. **52**:152. 1971.

灌木,高达1—2米;小枝圆柱形,微屈曲,密被短柔毛,幼时黄褐色,老时暗灰褐色;冬芽卵形,顶端微尖,深褐色,具2—4枚外露鳞片。叶片三角形至卵状三角形,长4—6厘米,宽3.5—4厘米,先端渐尖,基部截形至近心形,边缘有5—7浅裂片和尖锐重锯齿,上面具稀疏平铺柔毛,下面密被柔毛,在中脉和侧脉上更为显著;叶柄长约5毫米,密被短柔毛;托叶长圆形至披针形,长5—10毫米,先端钝或急尖,全缘或具少数锯齿,微具短柔毛。顶生总状花序,有花10—15朵,长约4—5厘米;苞片线状披针形,长约6毫米,两面微被柔毛;花梗长3—4毫米,近于无毛;花直径约6毫米;萼筒筒状,长8—9毫米,外面无毛,基部具少数腺毛,内面具柔毛;萼片三角形,先端尾尖,长约2毫米,内面被柔毛;花瓣倒卵形,先端圆钝,白色或淡粉色,稍长于萼片;雄蕊10—15,花丝短,药紫色,着生在萼筒边缘;子房仅顶端微具柔毛,内含4—5胚珠。蓇葖果长椭圆形,萼宿存,外被疏生腺毛。花期5月,果期7—9月。

产湖北、四川、云南、陕西、甘肃。生于山地丛林中,海拔1000—2500米。模式标本采自四川灌县。

本种与中华绣线梅 *N. sinensis* Oliv. 很相似,惟本种小枝、叶柄和叶片下面都具有密毛,叶边分裂较深,花梗、萼筒较短,易于区别。

图版14: 1—4. 中华绣线梅 *Neillia sinensis* Oliv. var. *sinensis*. 1.花枝×1; 2.果枝×1; 3.花纵剖面×3; 4.种子×5。 5—7. 矮生绣线梅 *Neillia gracilis* Franch., 5.花枝×1; 6.叶片×1; 7.花纵剖面×3。 8—11. 西康绣线梅 *Neillia thibetica* Bur. & Franch. var. *thibetica*, 8.叶片×1; 9.花纵剖面×3; 10.果实×3; 11.种子×5。 12—13. 毛叶绣线梅 *Neillia ribesioides* Rehd., 12.叶片下面×3; 13.花纵剖面×3。(张荣生绘)

