

10. 西康绣线梅 长穗南梨(经济植物手册)

Neillia thibetica Bur. & Franch. in Morot, Journ. Bot. 5:45. 1891; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:435. 1913; J. Vidal in Adansonia 3(1):163. pl. 3: 1—2. 1963. excl. var.——*N. velutina* Bur. & Franch. l. c., in textu, nom. nud.——*N. longiracemosa* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 29:304. 1892; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:446. 1906; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1:434. 1913; Sealy in Curtis's Bot. Mag. 165: t. 3. 1948.

西康绣线梅(原变种) 图版 14:8—11

N. thibetica Bur. & Franch. var. **thibetica**

灌木,高达1—3米;小枝圆柱形,微屈曲,密被短柔毛,幼时黄褐色,老时紫褐色;冬芽卵形,先端尖,紫红色,无毛或顶端微被毛,具2—4外露鳞片。叶片卵形至长椭圆形,稀三角卵形,长5—10厘米,宽3—6厘米,先端渐尖,基部圆形或近心形,边缘有尖锐重锯齿,常具不规则3—5浅裂,上面微具稀疏平铺柔毛,下面具柔毛,沿侧脉和中脉较密;叶柄长8—13毫米,密被柔毛;托叶披针形,先端尖,边缘具毛,几与叶柄等长,早落。顶生总状花序,长5—15厘米,有花15—25朵;花梗长3—4毫米,密被柔毛;苞片线状披针形,长约1厘米,微具柔毛,早落;萼筒筒状,长5—6毫米,内外两面密被短柔毛,萼片三角形,长2—3毫米,先端尾尖,全缘;花瓣倒卵形,先端圆钝,长约3毫米,淡白粉色;雄蕊15—20,花丝短,着生在萼筒边缘;子房仅先端具柔毛,花柱无毛,内含5—8胚珠。蓇葖果直立,顶端微具毛;萼宿存,外面密被柔毛和疏生腺毛;种子卵球形,光亮褐色,长约2毫米。花期5—6月,果期7—9月。

产四川西部、云南西北部。生溪边杂木林中,海拔1500—3000米。模式标本采自四川康定。

西康绣线梅裂叶变种

N. thibetica Bur. & Franch. var. **lobata** (Rehd.) Yü, comb. nov.——*N. longiracemosa* Hemsl. var. *lobata* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 1:257. 1920; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:449. 1933.

叶片分裂明显,基部裂片分裂达叶片中部,叶边有尖锐重锯齿;托叶卵状披针形,边缘具浅波状齿并有腺毛。

产四川西南部、云南西北部。海拔2900米。模式标本采自四川盐源。

J. Vidal 将本变种改为独立种 *N. lobata* (Rehd.) Vidal in Adansonia 3(1):157. pl. 2:5. 1963, 其主要理由为心皮内含2胚珠,认为与矮生绣线梅 *N. gracilis* Franch.