

和东北绣线梅 *N. uekii* Nakai 两种有近缘关系。而据本书作者就四川标本解剖，每一心皮内含胚珠 5—8 枚，其他萼筒形状、毛茸等特点近似西康绣线梅，故仍从 Rehder 意见，不予改变。

7. 小米空木属*——*Stephanandra* Sieb. & Zucc.

Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Wiss. Münch. **3**:740. 1843;

Benth. & Hook. f. Gen. Pl. **1**:612. 1865; Focke in Engler & Prantl,

Nat. Pflanzenfam. **3**(3):14. 1888; Maxim. in Acta Hort. Petrop.

6:217. 1879; Hutch. Gen. Flow. Pl. **1**:184. 1964.

落叶灌木；冬芽小形，常 2—3 芽迭生，有 2—4 枚外露鳞片。单叶，互生，边缘有锯齿和分裂，具叶柄与托叶。顶生圆锥花序稀伞房花序；花小形，两性；萼筒杯状，萼片 5；花瓣 5，约与萼片等长；雄蕊 10—20，花丝短；心皮 1，花柱顶生，有 2 个倒生胚珠。蓇葖果偏斜，近球形，熟时自基部开裂，含 1—2 球形光亮种子；种子近球形，种皮坚脆，胚乳丰富，子叶圆形。

本属的模式种：小米空木 *Stephanandra flexuosa* Sieb. & Zucc. = *Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel

本属 5 种，分布于亚洲东部。我国产 2 种。

枝条秀丽，秋季叶片呈红紫色，可栽培供观赏用。茎皮纤维可做造纸原料。

小米空木属分种检索表

- 1. 叶片卵形至长椭圆形，长 5—7 厘米，边缘浅裂；花梗和萼筒无毛 1. 华空木 *S. chinensis* Hance
- 1. 叶片三角卵形或卵形，长 2—4 厘米，边缘深裂；花梗和萼筒被柔毛 2. 小米空木 *S. incisa* (Thunb.) Zabel

1. 华空木(经济植物手册) 野珠兰(浙江土名)，中国小米空木(江苏植物名录) 图版 15:5—8

Stephanandra chinensis Hance in Journ. Bot. **20**:210. 1882; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **23**:228. 1887; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**:437. 1913; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5**:167. 1924; Chun in Sunyatsenia **4**:208. 1940; 中国高等植物图鉴 **2**:189. 图 2108. 1972.——*S. flexuosa* var. *chinensis* Pamp. in Nouv. Giorn. Bot. Ital. n. ser.

* 属的异名：野珠兰属(中国种子植物科属辞典)。