82:52. 1905.

红柄白鹃梅(原变种) 图版 16:4—7

E. giraldii Hesse var. **giraldii**

落叶灌木，高达 3—5 米；小枝细弱，开展，圆柱形，无毛，幼时绿色，老时红褐色；冬芽卵形，先端钝，红褐色，边缘微被短柔毛。叶片椭圆形、长椭圆形、稀长倒卵形，长 3—4 厘米，宽 1.5—3 厘米，先端急尖，突尖或圆钝，基部楔形、宽楔形至圆形，稀偏斜，全缘，稀中部以上有钝锯齿，上下两面均无毛或下面被柔毛；叶柄长 1.5—2.5 厘米，常红色，无毛，不具托叶。总状花序，有花 6—10 朵，无毛，花梗短或近于无梗；苞片线状披针形，全缘，长约 3 毫米，两面均无毛；花直径 3—4.5 厘米；萼筒浅钟状，内外两面均无毛；萼片短而宽，近于半圆形，先端圆钝，全缘；花瓣倒卵形或长圆倒卵形，长 2—2.5 厘米，宽约 1.5 厘米，先端圆钝，基部有长爪，白色；雄蕊 25—30，着生在花盘边缘；心皮 5，花柱分离。蓇果倒圆锥形，具 5 脊，无毛。 花期 5 月，果期 7—8 月。

产河北、河南、山西、陕西、甘肃、安徽、江苏、浙江、湖北、四川。生于山坡、灌木林中，海拔 1000—2000 米。模式标本采自陕西。

红柄白鹃梅绿柄变种 绿柄白鹃梅(中国树木分类学)

E. giraldii Hesse var. **wilsonii** (Rehd.) Rehd. in Bailey, Stand. Cycl. Hort. **2**:1194. 1914 & in Mitt. Deutsch. Dendr. Ges. **1914** (23):258. 1914.——*E. racemosa* Rehd. var. *wilsonii* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**:450. 1913.

叶片椭圆形至长圆形，有时具锯齿，叶柄长 1—2 厘米，绿色；花直径 5 厘米，有雄蕊 20—25；蓇果长达 1.5 厘米。

产安徽、浙江、湖北、四川。生于山谷多石地，海拔 600—1300 米。模式标本采自湖北兴山。

植株强壮，花朵繁茂，观赏价值很高。

3. **齿叶白鹃梅**(中国树木分类学) 榆叶白鹃梅(东北木本植物图志)，锐齿白鹃梅(经济植物手册) 图版 16:8—10

Exochorda serratifolia S. Moore in Hook. Ic. Pl. **13**: t. 1255. 1877; Maxim

图版 16：1—3.**白鹃梅 Exochorda racemosa** (Lindl.) Rehd.，1.花枝×1；2.花纵剖面×1；3.果枝×1。4—7.**红柄白鹃梅 Exochorda giraldii** Hesse var. **giraldii**，4.花枝×1；5.花纵剖面×1；6.果枝×1；7.种子×1。8—10.**齿叶白鹃梅 Exochorda serratifolia** S. Moore，8.花枝×1；9.果枝×1；10.种子×1。(王金凤绘)