

毛;花瓣平展,卵形或近圆形,长与宽各约2—3毫米,先端圆钝,基部具短爪,内面近基部微具柔毛,乳白色;雄蕊20,稍短于花瓣;花柱2,离生,与雄蕊近等长;子房先端具柔毛。果实陀螺形,长4—5毫米,深红色,下垂,表面具绒毛,常具2小核。花期6—7月,果期10月。

产湖北、四川、云南。生于江边或沟谷中,海拔1800—2700米。

此种和其近似种厚叶栒子 *C. coriaceus* Franch. 的主要异点,在于后者叶片倒卵形至椭圆形,先端多圆钝,花序密被黄色绒毛,果实倒卵形。

本种最初根据丘园栽培植物描写,种子来源于湖北。

系2.耐寒系 *Ser. Frigidi* Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. **1**:139. 1954.

本系有下列4种:

6. 粉叶栒子(经济植物手册)

Cotoneaster glaucophyllus Franch. Pl. Delav. 222. 1890; Stapf in Curtis's Bot. Mag. **153**:sub t. 9171. 1929, in textu; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **13**:302. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**:458. 1933; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle **6**:957. 1957; 中国高等植物图鉴 **2**:191. 图 2111. 1972.——*Photinia rosifoliolata* Lévl. in Bull. Acad. Géogr. Bot. **24**:142. 1914. & Fl. Kouy-Tcheou 349. 1915.——*C. transicus* Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Jena **17**:337. f. 4. 1968.

粉叶栒子(原变种) 图版18:5—8

C. glaucophyllus Franch. var. **glaucophyllus**

半常绿灌木,高2—5米,多分枝;小枝粗壮,圆柱形,暗灰褐色,幼时密被黄色柔毛,逐渐脱落,老时无毛。叶片椭圆形、长椭圆形至卵形,长3—6厘米,宽1.5—2.5厘米,先端急尖或圆钝,基部宽楔形至圆形,上面无毛,下面幼时微具短柔毛,以后无毛,有白霜,侧脉5—8对;叶柄粗壮,长4—6毫米,幼时具黄色柔毛,以后脱落无毛;托叶披针形,微具柔毛,多数脱落。花多数而密集成复聚伞花序,总花梗和花梗具带黄色柔毛;苞片钻形,稍有柔毛,早落;花梗长2—4毫米;花直径8毫米;萼筒钟状,外面有稀疏柔毛,内面无毛;萼片三角形,先端急尖,外面有稀疏柔毛,内面无毛或近无毛;花瓣平展,近圆形或宽倒卵形,长3—4毫米,先端多数圆钝,稀微缺,基部有极短爪,内面近基部微具柔毛,白色;雄蕊20,几与花瓣近等长;花柱通常2,离生,几与雄蕊等长或稍短;子房顶端微具柔毛。果实卵形至倒卵形,直径6—7毫米,红黄色,常具2小核。花期6—7月,果期10月。