

本组有下列 3 系。

系 1. 多花系 Ser. *Multiflori* Pojark. in Fl. URSS 9:329. 1939. emend. Yü, 植物分类学报 8:218. 1963.——Ser. *Racemiflorae* Pojark. op. cit. 331.——Sect. II. *Chaenopetalum* Koehne ser. *multiflori* Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:137. 1954.

本系有下列 7 种:

10. 水栒子(中国树木分类学) 栒子木(东北木本植物图志), 多花栒子(经济植物手册), 多花灰栒子(华北经济植物志要), 灰栒子、香李(河南土名)

Cotoneaster multiflorus Bge. in Ledeb. Fl. Alt. 2:220. 1830; Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. 3:22. t. 274. 1831; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:755. f. 424 c. 1906; Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:170. 1912; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 5:177. 1924 & 9:60. 1928; 陈嵘, 中国树木分类学 438. 图 334. 1937; Pojark. in Fl. URSS 9:329. 1939; Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:137. 1954; 刘慎谔等, 东北木本植物图志 293. 图版 103:205. 1955; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 6:965. 1957; 北京师范大学, 北京植物志上册 386. 图 331. 1962; 中国高等植物图鉴 2:191. 图 2112. 1972.——*C. reflexa* Carr. in Rev. Hort. 1870:520. 1871.

水栒子(原变种) 图版 21:1—3

C. multiflorus Bge. var. **multiflorus**——*C. multiflora* var. *typica* Hurusawa in Acta Phytotax. Geobot. 13:230. 1943.

落叶灌木, 高达 4 米; 枝条细瘦, 常呈弓形弯曲, 小枝圆柱形, 红褐色或棕褐色, 无毛, 幼时带紫色, 具短柔毛, 不久脱落。叶片卵形或宽卵形, 长 2—4 厘米, 宽 1.5—3 厘米, 先端急尖或圆钝, 基部宽楔形或圆形, 上面无毛, 下面幼时稍有绒毛, 后渐脱落; 叶柄长 3—8 毫米, 幼时有柔毛, 以后脱落; 托叶线形, 疏生柔毛, 脱落。花多数, 约 5—21 朵, 成疏松的聚伞花序, 总花梗和花梗无毛, 稀微具柔毛; 花梗长 4—6 毫米; 苞片线形, 无毛或微具柔毛; 花直径 1—1.2 厘米; 萼筒钟状, 内外两面均无毛; 萼片三角形, 先端急尖, 通常除先端边缘外, 内外两面均无毛; 花瓣平展, 近圆形, 直径约 4—5 毫米, 先端圆钝或微缺, 基部有短爪, 内面基部有白色细柔毛, 白色; 雄蕊约 20, 稍短于花瓣; 花柱通常 2, 离生, 比雄蕊短; 子房先端有柔毛。果实近球形或倒卵形, 直径 8 毫米, 红色, 有 1 个由 2 心皮合生而成的小核。花期 5—6 月, 果期 8—9 月。

产黑龙江、辽宁、内蒙古、河北、山西、河南、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、云南、西藏。普遍生于沟谷、山坡杂木林中, 海拔 1200—3500 米。苏联高加索、西伯利亚以及