

10:23. 1917.—*C. majuscula* (W. W. Smith) Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 12(10):766. 1973.

叶片厚而大,长 25—40 毫米,先端和基部近圆形或圆钝;花序和花形均较大;果实广梨形,长 8—9 毫米,宽约 7 毫米,深红色,2 小核。产云南西北部,生山坡灌丛中,海拔 3000—3400 米。

*C. handel-mazzettii* Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 12(10): 766. 1963.

枝和小枝初被柔毛或绒毛,一年后脱落无毛,深紫色;叶片近革质,宽椭圆形或圆形,长 10 毫米,宽 9 毫米,先端圆钝稀微凹,上面初被疏柔毛,下面被薄层绒毛;叶柄长 2—3 毫米。花果均未见。产四川西昌。

#### 14. 准噶尔栒子 准噶尔总花栒子(经济植物手册)

***Cotoneaster soongoricus*** (Regel & Herd.) Popov in Bull. Soc. Nat. Moscou n sér. 44:128. 1935; Pojark. in Fl. URSS 9:330. 1939; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 6:973. 1957; 中国高等植物图鉴 2:193. 图 2116. 1972.—*C. nummularia* β. *soongoricum* Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat. Moscou 39(2):59. 1866.—*C. fontanesii* γ. *soongorica* Regel in Acta Hort. Petrop. 2:313. 1873.—*C. racemiflora* (Desf.) K. Koch var. *soongorica* (Regel & Herd.) Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:754. f. 424 i. 1906; Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1: 168. 1912; Limpricht in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12:405. 1922; Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:138. 1954.—*C. racemiflora* var. *ovalifolia* (Boiss.) Hurusawa in Acta Phytotax. Geobot. 13:229. 1943. —*C. tomentella* Pojark. in Not. Syst. Herb. Inst. URSS. 21:200. 1961.

#### 准噶尔栒子(原变种)

***C. soongoricus*** (Regel & Herd.) Popov var. *soongoricus*

落叶灌木,高达 1—2.5 米;枝条开张,稀直升,小枝细瘦,圆柱形,灰褐色,嫩时密被灰色绒毛,成长时逐渐脱落无毛。叶片广椭圆形、近圆形或卵形,长 1.5—5 厘米,宽 1—2 厘米,先端常圆钝而有小凸尖,有时微凹,基部圆形或宽楔形,上面无毛或具稀疏柔毛,叶脉常下陷,下面被白色绒毛,叶脉稍微突起;叶柄长 2—5 毫米,具绒毛;花 3—12 朵,成聚伞花序,总花梗和花梗被白色绒毛;花梗长 2—3 毫米;花直径 8—9 毫米;萼筒钟状,外被绒毛,内面无毛;萼片宽三角形,先端急尖,外面有绒毛,内面近无毛或无毛;花瓣平展,卵形至近圆形,先端圆钝,稀微凹,基部有短爪,内面近基部微具带白色细柔毛,白色;雄蕊 18—20,稍短于花瓣,花药黄色;花柱 2,离生,稍短于雄蕊;子房顶部密生白色柔毛。果实卵形至椭圆形,长 7—10 毫米,红色,具 1—2 小核。