

25. 少花栒子

Cotoneaster oliganthus Pojark. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. URSS. 8:141. f. 3. 1938; in Fl. URSS 9:326. 1939; in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. URSS. 17:200. 1955.

落叶灌木, 高 1—2 米; 小枝幼时密被平铺绿灰色绒毛, 最后脱落近于无毛, 深褐色。叶片椭圆形或卵圆形, 先端常圆钝, 稀稍急尖, 有时微凹, 并有短尖, 基部宽楔形至圆形, 长 8—25 毫米, 宽 4—17 毫米, 上面深绿色, 有稀疏平铺柔毛或无毛, 下面被绿灰色绒毛; 叶柄有绒毛, 长 2—4 毫米。花序比叶片短约一半, 花 2—4 朵成总状短花束; 总花梗长 2—3 毫米; 花梗有毛, 长 2—5 毫米; 花朵小, 直径 7—8 毫米; 萼筒外被平铺稀疏柔毛, 萼片宽三角形, 先端圆钝或稍急尖, 有稀疏柔毛或近无毛, 边缘带紫色并有绒毛状睫毛; 花瓣淡红色, 内面基部有曲柔毛; 雄蕊 20; 花柱 2(—3), 离生。果实近球形至椭圆形, 直径 5—8 毫米, 红色, 常具 2(3) 小核。

产内蒙古、新疆。苏联哈萨克等地也有分布。

本种近似西北栒子 *C. zabelii* Schneid., 惟叶片和花朵均较小, 花序较短, 花萼被毛较少, 可以区别。

26. 细弱栒子 细弱灰栒子(华北经济植物志要)

Cotoneaster gracilis Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:167. 1912; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 5:177. 1924; 中国高等植物图鉴 2:197. 图 2123. 1972.——*C. difficilis* Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Jena 21:1017. 1972.

落叶灌木, 高 1—3 米; 小枝纤细, 圆柱形, 棕红色至灰褐色, 幼时密被平铺柔毛, 逐渐脱落, 一年生枝无毛。叶片卵形至长圆卵形, 长 2—3.5 厘米, 宽 1—2 厘米, 先端圆钝或急尖, 稀微缺, 基部圆形, 全缘, 上面无毛或微具柔毛, 叶脉下陷, 下面密被白色绒毛, 侧脉 3—4 对显明突起; 叶柄长 2—3 毫米, 被白色绒毛; 托叶细小, 钻状, 早落, 有毛。聚伞花序具花 3—7 朵, 总花梗和花梗稍具柔毛; 苞片线形, 细小, 有柔毛; 花梗长 3—6 毫米; 花直径 6—7 毫米; 萼筒钟状, 内外两面均无毛, 红色; 萼片三角卵形, 先端圆钝或微尖, 外面无毛, 内面仅先端沿边缘有白色细柔毛; 花瓣直立, 近圆形, 直径约 3 毫米, 粉红色; 雄蕊 20, 稍短于花瓣; 花柱通常 2, 离生, 短于雄蕊; 子房先端具柔毛。果实倒卵形, 直径约 5 毫米, 红色, 外面微具柔毛, 常具 2 小核。花期 5—6 月, 果期 8—9 月。

产陕西、甘肃、湖北、四川。生于山坡或河滩地灌丛中, 海拔 1000—3000 米。模式标本采自湖北兴山。

此种和西北栒子 *C. zabelii* Schneid. 相近似, 主要区别在于后者花序具花 3—13 朵, 花萼外面具细柔毛, 叶片下面被灰色或黄色绒毛, 可以识别。又与全缘栒子 *C. integerrimus* Medic. 相比, 后者叶片较大, 先端多急尖, 但花序较短尚不及叶片之半, 花朵较大, 枝条粗壮, 易于区分。

27. 山东栒子

Cotoneaster schantungensis Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Jena **21**:1018. 1972.

落叶灌木, 高达 2 米; 小枝圆柱形, 细瘦, 幼时密被灰色柔毛, 以后脱落无毛, 红褐色或灰褐色。叶片纸质, 宽椭圆形或宽卵形, 有时倒卵形稀近圆形, 长 2—3.5 厘米, 宽 1.5—2.4 厘米, 先端多圆钝或微凹, 稀有短尖, 基部宽楔形至圆形, 上面初有柔毛, 以后脱落, 下面初时密被柔毛, 以后减少, 侧脉 3—5 对稍突起; 叶柄长 2—4.5 毫米, 微有柔毛; 托叶披针形, 长 1—2 毫米, 有柔毛, 部分宿存。花序有花 3—6 朵, 总花梗和花梗有柔毛, 以后脱落近于无毛; 萼筒具稀疏柔毛; 萼片宽三角形。果实倒卵形, 长 6—8 毫米, 深红色, 有稀疏柔毛或几无毛, 2 小核。花期 5 月, 果期 8—9 月。

产山东。生于石质山坡地, 海拔 900—1850 米。模式标本采自济南龙洞。

本种与西北栒子 *C. zabelii* Schneid. 为近缘种, 惟后者下面密被绒毛, 总花梗、花梗和萼筒均密被柔毛, 易于区别。又和全缘栒子 *C. integerrimus* Medic. 的主要区别在于后者叶片下面密被灰白色绒毛, 萼筒无毛, 果实近球形, 红色。

28. 西北栒子 札氏栒子(经济植物手册), 杂氏灰栒子(华北经济植物志要), 土兰条(河南土名) 图版 23:9—12

Cotoneaster zabelii Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**:479. f. 420 f-h. 422 i-k. 1906 & in Fedde, Repert. Sp. Nov. **3**:220. 1906; Kom. in Acta Hort. Petrop. **25**:816. 1907; Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. **1**:166. 1912; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **5**:175. 1924; Wils. in Journ. Arn. Arb. **9**:62. 1928; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle **6**:975. 1957; 中国高等植物图鉴 **2**:197. 图 2124. 1972.

落叶灌木, 高达 2 米; 枝条细瘦开张, 小枝圆柱形, 深红褐色, 幼时密被带黄色柔毛, 老时无毛。叶片椭圆形至卵形, 长 1.2—3 厘米, 宽 1—2 厘米, 先端多数圆钝, 稀微缺, 基部圆形或宽楔形, 全缘, 上面具稀疏柔毛, 下面密被带黄色或带灰色绒毛; 叶柄长 1—3 毫米, 被绒毛; 托叶披针形, 有毛, 在果期多数脱落。花 3—13 朵成下垂聚伞花序, 总花梗和花梗被柔毛; 花梗长 2—4 毫米; 萼筒钟状, 外面被柔毛; 萼片三角形, 先端稍钝或具短尖头, 外面具柔毛, 内面几无毛或仅沿边缘有少数柔毛; 花瓣直立, 倒卵形或近圆形, 直径 2—3 毫米, 先端圆钝, 浅红色; 雄蕊 18—20, 较花瓣短; 花柱 2,