

西南部。

系 2. 两列系 Ser. Distichi Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:127. 1954. — Ser. *Integerrimae* Pojark. in Fl. URSS 9:323. 1939. p. p.

本系有下列 15 种:

44. 两列栒子 两列枝栒子(经济植物手册)

Cotoneaster nitidus Jacq. in Journ. Soc. Imp. Cent. Hort. 3:516. 1857; Exell in Journ. Bot. 68:299—300. 1930; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 6:966. 1957. — *C. disticha* Lange in Bot. Tridssk. 13:19. 1882; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:745. f. 419 d. 1906; Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:154. 1912; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:457. 1933; Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:127. 1954. — *C. rupestris* Charlt. in Gard. Chron. n. ser. 18:598. 1882. — *C. rotundifolia* auct. non Lindl. 1829; Baker in Saunders, Refug. Bot. 1: t. 54. 1869; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2:386. 1878. excl. syn.; Hemsl. in Curtis's Bot. Mag. 131: t. 8010. 1905.

两列栒子(原变种)

C. nitidus Jacq. var. **nitidus**

落叶或半常绿直立灌木,高达 2.5 米;小枝圆柱形,多少排列成二列状,幼时密被黄色长柔毛,老时逐渐脱落,呈灰褐色。叶片宽卵形或宽倒卵形,长 8—15(20) 毫米,宽 7—13(15) 毫米,先端急尖并常具凸尖头,稀圆钝,基部圆形或宽楔形,全缘,两面对有紧贴长柔毛,惟上面毛较多;叶柄长 1—2 毫米,被柔毛;托叶披针形,有柔毛,至果期尚宿存。花通常单生,直径 5—7 毫米,花梗长 1—2 毫米;萼筒钟状,内外两面均无毛;萼片宽三角形,先端微尖或钝,外面无毛,内面先端沿边缘有柔毛;花瓣直立,卵形或近圆形,长 3—4 毫米,宽 3 毫米,先端圆钝,白色,有红晕;雄蕊 20,短于花瓣;花柱 3(2—4),离生,稍短于雄蕊;子房先端有短柔毛。果实宽倒卵形,直径 7—8 毫米,猩红色,下垂,有短梗,小核 3(2—4)。花期 6 月,果期 9—10 月。

产云南、四川、西藏。生于灌木丛中、杂木林缘或山谷及草坡中,海拔 1600—4000 米。印度、缅甸、不丹、尼泊尔山区习见。

本种是直立性灌木,小枝和叶片都多少呈两列式排列;小枝幼时密被黄色长柔毛;叶片质地较厚,两面均有长柔毛,上面较密;花单生,萼筒外面无毛;果实猩红色,常具 3 小核,秋季凋落较迟,引人注目,这些特点易与本属其他种类区别。

两列栒子小叶变种