

C. nitidus Jacq. var. **parvifolius** (Yü) Yü, comb. nov.——*C. distichus* var. *parvifolius* Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:129. 1954.——*C. nitidus* subsp. *cavei* (Klotz) Ohashi in Fl. E. Himal. 120. 1966.

本变种与原变种区别在其叶片较小,长4—7毫米,宽5—6毫米,常呈宽倒卵形或宽卵形,先端圆钝或微缺,外观近似平枝栒子小叶变种 *C. horizontalis* Dcne. var. *perpusillus* Schneid., 惟本变种叶片上面柔毛较多,萼筒无毛,易于识别。

产云南西北部高山地区,海拔2700—3200米。分布到缅甸北部。

两列栒子大叶变种

C. nitidus Jacq. var. **duthieanus** (Schneid.) Yü, comb. nov.——*C. disticha* var. *duthieana* Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:745. 1906; Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:128. 1954.

本变种具有较大叶片,长12—25毫米,宽12—18毫米,先端具短尖,叶柄长约4毫米。

产云南西北部,海拔2500—2700米。分布到缅甸北部。

45. 藏南栒子

Cotoneaster taylorii Yü in Bull. Brit. Mus. Bot. 1:129. pl. 3. 1954; Klotz in Bull. Bot. Surv. Ind. 5:211. 1963.——*C. nitidus* Jacq. subsp. *taylorii* (Yü) Ohashi in Fl. E. Himal. 1:120. 1966.

落叶灌木或小乔木,高2—3米;小枝圆柱形,幼时密被棕黄色柔毛,老时逐渐脱落近无毛,灰褐色。叶片近圆形或宽卵形,长10—12毫米,宽9—10毫米,先端圆钝或急尖,基部圆形,稀宽楔形,全缘,上面光亮,初期两面微具硬毛,以后脱落至于无毛,上面叶脉微下陷,下面侧脉不显著;叶柄长2—3毫米,具棕黄色柔毛;托叶膜质,披针形,长1—2毫米,稍具棕黄色柔毛。花2—3朵;花梗具硬毛,长3—5毫米;苞片膜质,披针形,长1—2毫米;萼筒钟状,内外两面均无毛;萼片宽三角形,先端钝,边缘微具柔毛;花瓣直立,近圆形,长3毫米,宽几与长相等,先端圆钝,基部具短爪,暗红色,边缘白色;雄蕊10,短于花瓣,无毛;花柱2,离生,较雄蕊短;子房先端密生白色柔毛。花期5月。

产西藏东南部,生于溪旁,海拔3750米。模式标本采自地康保那拉。

此种和两列栒子 *C. nitidus* Jacq. 很近似,主要区别在于后者花单生,稀2朵,叶片先端多数急尖,稀圆钝,雄蕊20,并具有显明两列状分枝习性。

46. 疣枝栒子(经济植物手册)