

直径 6—7 毫米;花梗长 2—4 毫米,具柔毛;萼筒钟状,外面微具柔毛,内面无毛;萼片三角形,先端急尖,外面有柔毛,内面仅先端或边缘微具毛;花瓣直立,卵形或倒卵形,长 3—4 毫米,宽 2—3 毫米,先端圆钝,基部有短爪,粉白色;雄蕊 15—20,比花瓣短;花柱 4—5,离生,稍短于雄蕊;子房先端有柔毛。果实椭圆形,长 8—9 毫米,猩红色,具短梗,多数下垂,内常具 3 小核。花期 6 月,果期 9—10 月。

产云南西部。生于沟边或多石砾地,海拔 2300—3400 米。模式标本采自镇康。

本种和两列栒子 *C. nitidus* Jacq. 相近,仅后者花常单生,花萼外面无毛,花柱常 3,可以区别。又和匍匐栒子 *C. adpressus* Bois 近似,但后者系平铺灌木,叶片上面无毛,花 1—2 朵,雄蕊 10—15,花柱 2,果实内常具 2 小核,易于区别。

55. 光泽栒子 亮叶栒子(经济植物手册)

Cotoneaster nitens Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:156. 1912; Klotz in Wiss. Zeits. Univ. Halle 6:966. 1957.

落叶灌木,高达 3.5 米,分枝多而广展;枝暗灰褐色,嫩时被糙伏毛,以后脱落无毛。叶片卵形或有时椭圆形,长 10—20 毫米,宽 7—15 毫米,先端圆钝或急尖,基部圆形或宽楔形,全缘,上面具光泽,无毛,下面幼时长柔毛,老时脱落近无毛;叶柄长 2—3 毫米,具长柔毛,有时近无毛;托叶线形,有毛,部分宿存。花 2—3 (8) 朵成聚伞花序,总花梗和花梗具长柔毛,花梗长 2—4 毫米;花直径 7—8 毫米;苞片线形,有毛;萼筒钟状,外面具稀疏长柔毛,内面无毛;萼片三角形,先端急尖或稍钝,外面微具柔毛,内面无毛或仅先端具柔毛;花瓣近圆形或宽倒卵形,长 4—4.5 毫米,宽 3—4 毫米,先端钝,淡红色;雄蕊 10—12,比花瓣短;花柱通常 2,稀 3,离生,稍短于雄蕊;子房先端具柔毛。果实椭圆形,直径约 7 毫米,紫黑色,有光泽,无毛,小核 1—2。花期 5—6 月,果期 9—10 月。

产四川西部。生于山坡、沟边或杂木林内,海拔 1900—2900 米。模式标本采自松潘。

此种和散生栒子 *C. divaricatus* Rehd. & Wils. 很相近,惟后者叶片多数椭圆形,果实红色,具小核 1—3,果梗较短,可以区别。

56. 丹巴栒子

Cotoneaster harrismithii Flinck & Hylmø in Bot. Not. 115(1):29—34. f. 1. 3. 1962.

落叶灌木,高 1—2 米;枝弧曲,有时下垂,嫩枝具灰黄色糙伏长柔毛,一年生枝变无毛,老时红褐色;冬芽稍急尖,具柔毛。叶片椭圆形至卵状椭圆形,长 7—20 毫米,