

色绒毛。果实近球形,内含5小核。花期5月。

产云南。生于澜沧江两岸沙地,海拔800米。老挝也有分布。

本种叶片形状近似火棘 *P. fortuneana* (Maxim.) Li, 唯本种叶均丛生小枝上,花密集,萼筒外被绒毛,矮生灌木多不具刺,易与火棘区别。

7. 密花火棘 图版 24:9—12

Pyracantha densiflora Yü, 植物分类学报 8: 220. 1963.

常绿灌木,具短枝刺,刺长1—2厘米,嫩枝密被锈色绒毛,老枝紫褐色,粗壮无毛。叶密集于短枝上,叶片倒卵形至倒卵状椭圆形,长1—1.8厘米,宽6—9毫米,先端圆钝或截形,基部宽楔形,边缘有圆细锯齿,齿尖稍向内弯,基部全缘,上面光亮,嫩叶下面有褐色绒毛,以后脱落无毛;叶柄短,长不足2毫米。花6—10朵密集,生于短枝顶端,成伞房花序,直径1.5—2.5厘米,花梗、萼筒和萼片外面密被锈色绒毛;花直径8—12毫米;萼筒钟状,萼片三角形;花瓣卵形,长4—6毫米,宽3—4毫米,白色;雄蕊20,长2—3毫米;花柱5,离生,几与雄蕊等长,心皮5,腹面分离,背面1/2与萼筒相连,子房顶端密生白色柔毛。果实近球形,内含5小核。花期6月。

产广西,海拔1000米。模式标本采自隆林。

本种近似澜沧火棘 *P. inermis* Vidal, 惟后者不具短枝刺,叶片长圆形至长圆倒卵形,先端急尖,有短柄。而本种通常具枝刺,叶片多倒卵形,先端圆钝,几无柄,两者易于区别。

12. 山楂属*——*Crataegus* L.

L. Sp. Pl. 475. 1753. p. p.; Gen. Pl. ed. 5. 213. no. 547.
1754. p. p.; Lindl. in Trans. Linn. Soc. 13:105. 1822; Benth. &
Hook. f. Gen. Pl. 1: 626. 1865; Sarg. Silva N. Am. 4:83. 1892
& 13:31. 1902; Palm. in Journ. Arn. Arb. 6:5-128. 1925; Hutch.
Gen. Flow. Pl. 1:212. 1964.——*Mespilus* Scop. Fl. Carniol 1:345.
1772. p. p.; Focke in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3(3):26.
1888. p. p.; Aschers. & Graebn. Syn. Mitteleur Fl. 6(2):13. 1906.
p. p.

落叶稀半常绿灌木或小乔木,通常具刺,很少无刺;冬芽卵形或近圆形。单叶互

* 属名根据中国种子植物科属辞典,其他异名:山楂(陶弘景本草集注,李时珍本草纲目)。

