

5. 窄叶石楠

Photinia stenophylla Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:480. Abb. 15. Nr. 3. 1933; Vidal in Fl. Thailand 2(1):40. 1970.

灌木,高1—2米;小枝初微生柔毛,以后脱落,有稀疏圆形皮孔;冬芽微小,鳞片近锥形,无毛。叶片革质,带状披针形或长圆披针形,长3.5—9厘米,宽1—2厘米,先端急尖或圆钝,具短尖头,基部渐狭,边缘稍向外卷,具内弯钝锯齿,两面无毛,中脉和侧脉在下面隆起,侧脉18—20对,在近边缘处连合,网脉显明;叶柄宽扁,有沟,长4—10毫米,初具柔毛,以后无毛;托叶钻形,早落。聚伞花序顶生,直径3—4厘米,有花15—25朵,总花梗和花梗无毛;花梗长5—10毫米;萼筒杯状,长1.5—2毫米,外面无毛;萼片三角形,约和萼筒等长,先端急尖,外面无毛,内面有柔毛;花瓣白色,倒卵形,长2—3毫米,先端微缺,内面有白色柔毛;雄蕊20,约和花瓣等长;花柱2,合生,仅顶端分离,子房顶端有柔毛。果实卵形,长约5毫米,宽约3毫米,红色,肉质,光滑,无毛,顶端有内弯宿存萼片,内含4种子。花期4月,果期7月。

产贵州(三都、黎平)、广西(融水、大苗山)。生于山谷水旁或河床阳处灌丛中,海拔200—400米。模式标本采自贵州三都。泰国也有分布。

本种的特点在于叶片带状披针形或长圆披针形,叶边外卷,有钝锯齿,除萼片、花瓣、子房外,全体无毛。

6. 罗城石楠 图版 29:7—9

Photinia lochengensis Yü, 植物分类学报 8:226. 1963.

小乔木或灌木(?);小枝细弱,幼时疏生柔毛,紫褐色或黑褐色;冬芽小,卵形,急尖,无毛。叶片革质,倒披针形,稀披针形,长3.5—5厘米,宽1—2厘米,先端急尖,常具短尖头,基部渐狭成楔形,边缘微向外反卷并有起伏,具尖锐内弯细锯齿,上面深绿色,下面干燥时黄褐色,除幼时在中肋稍有柔毛外,两面无毛,中脉在上面下陷,在下面凸起,侧脉9—13对,纤细,在下面稍微凸起;叶柄长5—8毫米,幼时有柔毛,后脱落。花成顶生伞房花序,直径2—4厘米;总花梗和花梗无毛;花直径3—4毫米;萼筒钟状,长宽各约1.5毫米;萼片直立,宽三角形,长1毫米,无毛;花瓣白色,倒卵形,长约2毫米,无毛,先端圆钝,基部具短爪;雄蕊20,短于花瓣;花柱2,稀为3,离生,子房顶端具白色柔毛。果实近球形至卵球形,直径3毫米,无毛,具宿存内弯萼片。

产广西。模式标本采自罗城。

本种叶片小,长3.5—5厘米,果实也小,直径仅3毫米,极易和本属其它种区别。