

生复伞房花序,直径9—12厘米;总花梗及分枝密生灰白色绵毛;花梗近无毛,长2—5毫米;花直径5—6毫米;萼筒杯状,长1毫米,外面无毛或微有柔毛;萼片卵形,长1毫米,具缘毛,先端钝;花瓣白色,近圆形,直径约2毫米,无毛,具极短爪;雄蕊20,花丝较花瓣短;花柱2,离生,子房顶端密生柔毛。

产湖南。模式标本采自雪峰山。

本种与球花石楠 *P. glomerata* Rehd. & Wils. 相比,后者叶边锯齿较浅,幼枝、叶柄、总花梗、花梗、萼筒及萼片均密生黄色绒毛,易于区别。

9. 广西石楠

Photinia kwangsiensis Li in Journ. Arn. Arb. 26:62. 1945.

乔木,约高15米;幼枝密生伏贴棕色长柔毛,老枝有棕色长柔毛,或近无毛,皮孔不显明。叶片薄革质,长圆卵形、长圆倒卵形或长圆披针形,长7—12厘米,宽3—4.5厘米,先端渐尖或尾尖,基部近圆形或宽楔形,边缘微反卷,有密生具腺的长短不齐如重锯齿状锯齿,上面亮绿色,除中脉有柔毛外余无毛,下面密生棕色长柔毛,中脉隆起,侧脉12—15对,网脉显明;叶柄长1—2(—2.5)厘米,密生长柔毛。顶生伞房花序具多花,长8—9厘米,直径12—13厘米,总花梗和花梗皆密生棕色长柔毛;花梗长3—5毫米。果实近球形,桔黄色,直径5毫米,有长柔毛或近无毛,顶端有内弯宿存萼片。果期10月。

产广西。生于河边混交林中,海拔约3000米。模式标本采自象州瑶山六巷。

本种特点为幼枝、花梗、叶柄、叶片下面中脉及侧脉皆密生棕色长柔毛;叶边有密生具腺的锯齿,侧脉和网脉在叶片下面显明,易与本属其他种区别。

叶供药用,可治风湿痛。

10. 宜山石楠

Photinia chingiana Hand.-Mazz. in Sinensia 2:125. 1932.

灌木,高5米;幼枝、总花梗、花梗、叶柄及叶片下面均有灰色长柔毛,老枝灰色,几无毛,皮孔微小,不显明。叶片革质,长圆椭圆形,长10—15厘米,宽3—6厘米,先端渐尖成细长尾状,基部狭圆形,边缘外卷,中部以上具疏生内弯细锯齿,中部以下近全缘,锯齿不明显,上面无毛,中脉下陷,下面叶脉隆起,侧脉约20对,网状;叶柄粗壮,长5—12毫米。伞房花序宽6厘米,总花梗近轮生,花梗长2—5毫米。幼果绿色,倒卵形,长5毫米,肉质,微有疏长柔毛,顶端有直立、三角形宿存萼片及2花柱。

果期8月。

产广西。生于开旷森林或河岸,海拔1000米。模式标本采自宜山。