

米,幼时有长柔毛;托叶线状披针形,略和叶柄等长,每侧有2—4锯齿。花成顶生伞房花序,直径2.5—3厘米,总花梗具稜角,有柔毛;花梗长2—5毫米;苞片及小苞片宿存,线状披针形,有少数锯齿,下部者成叶状,近无毛;花直径9—10毫米;萼筒杯状,直径3毫米,外面疏生柔毛;萼片宽卵形,先端圆钝,内面无毛,外面有疏柔毛或无毛;花瓣白色,开展,近圆形,直径3.5毫米,先端多微缺;雄蕊20,长约为花瓣的一半;花柱2,连合达中部,有柔毛,较雄蕊稍短;子房2室,顶端密生柔毛。花期5月。

产四川西部,海拔2200—2400米。模式标本采自大渡河谷。

本种叶片较小,边缘有刺状齿,如小槲状,幼枝、叶片下面及花序有长柔毛,易与他种区别。

18. 桃叶石楠 石斑木(广东土名)

Photinia prunifolia (Hook. & Arn.) Lindl. in Bot. Reg. n. ser. **10**:sub t. 1956. 1837; Benth. Fl. Hongk. 107. 1861; Dcne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris **10**:140. 1874; Schneid. Ill. Handb. Laubh. **1**:707. 1906; Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. **25**:402. 1919; Merr. & Chun in Sunyatsenia **2**:242. 1935; 陈焕镛等,海南植物志 **2**:202. 图 406. 1965; Vidal in Adansonia **5**: 223. 1965 & in Fl. Camb. Laos et Vietn. **6**:40. pl. 5:8—10. 1968; 中国高等植物图鉴 **2**:210. 图 2150. 1972.——*P. serrulata* var. *prunifolia* Hook. & Arn. Bot. Beechey's Voy. 185. 1833.——*P. melanostigma* Hance in Journ. Bot. **20**:5 1852.——*P. consimilis* Hand.-Mazz. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien. Math-Naturw. Kl. **59**:103. 1922 & Symb. Sin. **7**:479. 1933.

桃叶石楠(原变种) 图版 30:1—5

P. prunifolia (Hook. et Arn.) Lindl. var. **prunifolia**

常绿乔木,高10—20米;小枝无毛,灰黑色,具黄褐色皮孔。叶片革质,长圆形或长圆披针形,长7—13厘米,宽3—5厘米,先端渐尖,基部圆形至宽楔形,边缘有密生具腺的细锯齿,上面光亮,下面满布黑色腺点,两面均无毛,侧脉13—15对;叶柄长10—25毫米,无毛,具多数腺体,有时且有锯齿。花多数,密集成顶生复伞房花序,直径12—16厘米,总花梗和花梗微有长柔毛;花直径7—8毫米;萼筒杯状,外面有柔毛;萼片三角形,长1—2毫米,先端渐尖,内面微有绒毛;花瓣白色,倒卵形,长约4毫米,先端圆钝,基部有绒毛;雄蕊20,与花瓣等长或稍长;花柱2(—3),离生,子房顶端有毛。果实椭圆形,长7—9毫米,直径3—4毫米,红色,内有2(—3)种子。花期3—4月,果期10—11月。

产广东、广西、福建、浙江、江西、湖南、贵州、云南。生于海拔900—1100米疏林