

本属其他种区别。花、果供药用,治久咳。

22. 独山石楠 图版 31:6—8

*Photinia tushanensis* Yü, 植物分类学报 8:229. 1963.

灌木,高5米;小枝粗壮,幼时密生灰色绒毛,以后脱落,老时无毛,灰褐色或灰黑色。叶片厚革质,长圆椭圆形,长11—17厘米,宽3—5厘米,先端急尖或圆钝,具短尖头,基部圆形,边缘稍外卷,全缘或波状缘,上面初生绒毛,后脱落无毛或近无毛,下面密生黄褐色绒毛,逐渐脱落但有部分残存,中脉粗壮,在上面深陷,在下面显著隆起,侧脉13—15对;无叶柄或有短粗叶柄,长3—5毫米,密生绒毛,或脱落无毛。花多数,密集成顶生复伞房花序,直径9厘米;总花梗和花梗密生灰色绒毛;花梗长2毫米或近无梗;花直径5—6毫米;萼筒筒状,长3—5毫米,外面密生灰色绒毛;萼片卵形,长约1毫米,先端钝,外面有绒毛,内面无毛;花瓣倒卵形,长2毫米,无毛,基部具短爪;雄蕊20,较花瓣短;花柱2,离生,子房外有绒毛。花期7月。

产贵州。生于山顶灌丛中,海拔840米。模式标本采自独山。

本种与厚叶石楠 *P. crassifolia* Lévl. 相近,但叶片和萼筒都较长,外面密生灰色绒毛,是其异点。

组2. 落叶石楠组 Sect. *Pourthiaea* (Dcne.) Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1: 708. 1906.——*Pourthiaea* Dcne. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 10:146. 1874.

本组分下列二系。

系1. 多花系 Ser. *Multiflorae* Kuan, 植物分类学报 8: 226. 1963.

本系有下列16种:

23. 中华石楠 假思桃(广东土名),牛筋木(广西土名),波氏石楠(经济植物手册)

*Photinia beauverdiana* Schneid. in Bull. Herb. Boiss. sér. 2. 6:319. 1908 & Ill. Handb. Laubh. 1:710. f. 393 p-q. 1906; Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:187. 1912; Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26: 570. 1920; Rehd. in Journ. Arn. Arb.

图版 31: 1—5. 厚叶石楠 *Photinia crassifolia* Lévl., 1. 果枝×1; 2. 花×3; 3. 花纵剖面×3; 4. 果实×3; 5. 果实横剖面×3。6—8. 独山石楠 *Photinia tushanensis* Yü, 6. 花枝×1; 7. 花瓣×3; 8. 花纵剖面×3。9—13. 临桂石楠 *Photinia chihsiniana* Kuan, 9. 花枝×1; 10. 花×3; 11. 花纵剖面×5; 12. 果实×3; 13. 果实横剖面×3。(吴彰桦绘)

