

## 25. 厚齿石楠 图版 29:3—6

*Photinia callosa* Chun ex Kuan, 植物分类学报 8:229. 1963.

灌木或小乔木, 高达 12 米; 小枝无毛, 灰褐色至黑褐色, 有少数黄色皮孔; 冬芽卵形, 长 2—3 毫米, 鳞片褐色, 无毛。叶片纸质, 披针形或长圆披针形, 长 5.5—13 厘米, 宽 1.5—3.5 厘米, 先端尾尖或渐尖, 基部楔形, 边缘微外卷, 具浅锐锯齿, 有时几近全缘, 两面无毛, 中脉在上面凹陷, 在下面隆起, 侧脉 12—16 对; 叶柄长 5—15 毫米, 无毛。复伞房花序顶生, 直径 4—6 厘米, 具多数花; 总花梗和花梗均无毛, 具疣点, 总花梗粗厚, 长 3—4 厘米, 花梗长 3—7 毫米; 花直径 6—9 毫米; 萼筒钟状, 长 1—1.5 毫米, 无毛; 萼片卵形, 长为萼筒的一半, 先端钝, 无毛; 花瓣白色, 倒卵状长圆形, 长 2—3 毫米, 先端钝, 无毛, 基部有短爪; 雄蕊 20, 较花瓣稍短; 花柱 2—3, 大部分合生, 无毛。果实卵球形, 长 4—6 毫米, 直径 3—4 毫米, 黑黄色, 部分萼片脱落; 果梗长 5—9 毫米, 具显明疣点; 种子 1, 卵形, 长约 4 毫米, 黑色。花期 4 月, 基期 9 月。

产广东、广西。生于杂木林中。模式标本采自广东信宜镬厂坪。

本种和福建石楠 *P. fokienensis* (Franch.) Franch. ex Card. 相近, 但后者边缘具密生尖锐锯齿, 花朵较大, 直径 10—12 毫米, 花梗及萼片均较长, 可以区别。若和中华石楠 *P. beauverdiana* Schneid. 比较, 本种叶片较厚, 披针形或长圆披针形, 边缘具浅锐锯齿, 中脉在下面无毛, 萼片极短, 果实较小, 可以区别。

## 26. 福建石楠

*Photinia fokienensis* (Franch.) Franch. mss. in herb. Mus. Paris ex Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26:570. 1920. — *P. glabra* Hemsl. var. *fokienensis* Franch. in Bull. Soc. Bot. France 46:207. 1899. — *P. latouchei* Franch. in herb. Mus. Paris.

落叶灌木或小乔木, 高达 5 米; 小枝细, 无毛, 棕黑色, 有散生皮孔; 冬芽卵形, 无毛。叶片薄纸质, 披针形或长圆披针形, 长 7—10.5 厘米, 宽 1.5—3.5 厘米, 先端长渐尖, 基部渐狭成楔形, 边缘具密生尖锐细锯齿, 两面无毛或下面中脉上微有柔毛, 叶脉在上面凹陷, 在下面隆起, 侧脉 7—9 对; 叶柄长 5—10 毫米, 无毛。伞房花序顶生, 疏生, 少花; 总花梗、花梗、萼筒及萼片均无毛, 前二者有疣点; 花梗细, 长 8—12 毫米; 花直径 10—12 毫米; 萼筒杯状, 长约 2 毫米; 萼片三角卵形, 长 1—1.5 毫米, 先端急尖; 花瓣白色, 宽倒卵形, 先端微凹, 有爪; 雄蕊约 20; 花柱 3, 近顶端连合, 子房顶端有柔毛。花期 5 月。

产福建。生于山谷林中。模式标本采自古田。

本种与中华石楠 *P. beauverdiana* Schneid. 相近, 但本种叶片披针形或长圆披针

