

产印度。

## 锐齿石楠变种检索表

1. 叶片披针形或长圆披针形。
  2. 复伞房花序短, 有数朵花; 果实无毛。……………原变种 var. *arguta*
  2. 复伞房花序长 5—8 厘米, 有多数花; 果实有柔毛。……………毛果变种 var. *hookeri* (Dcne.) Vidal
1. 叶片窄披针形、长圆披针形或长圆倒披针形; 果实无毛。……………
  - ……………柳叶变种 var. *salicifolia* (Dcne.) Vidal

### 锐齿石楠毛果变种 图版 34:9—11

*P. arguta* Lindl. var. *hookeri* (Dcne.) Vidal in *Adansonia* 5:229. 1965 & in *Fl. Thailand* 2(1):41. 1970. — *Pourthiaea hookeri* Dcne. in *Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris* 10:148. 1874. — *Pourthiaea arguta* Dcne. var. *hookeri* Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* 2:382. 1878. — *Photinia hookeri* (Dcne.) Merr. in *Brittonia* 4:82. 1941.

叶片长圆披针形, 长 7—10 厘米, 宽 1.5—3 厘米。花多数成顶生复伞房花序, 直径 5—8 厘米; 总花梗和花梗有柔毛。果实卵球形, 长 6—7 毫米, 棕红色, 有柔毛。

产云南(西双版纳)。生于河边灌丛中, 海拔 300—900 米。分布印度、缅甸。

### 锐齿石楠柳叶变种

*P. arguta* Lindl. var. *salicifolia* (Dcne.) Vidal in *Adansonia* 5:229. 1965 & in *Fl. Camb. Laos et Vietn.* 6:50. pl. 7:8—10. 1968 & in *Fl. Thailand* 2(1):41. 1970. — *Pourthiaea salicifolia* Dcne. in *Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris* 10:148. 1874. — *Photinia salicifolia* (Dcne.) Schneid. *Ill. Handb. Laubh.* 1:709. 1906. — *Photinia lancifolia* Rehd. & Wils. in *Sarg. Pl. Wils.* 1:191. 1912.

叶片窄披针形、长圆披针形或长圆倒披针形, 稀长圆形, 长 5—9 厘米, 宽 1.5—3 厘米。花多朵密集成顶生复伞房花序, 直径 2.5—4 厘米; 有长柔毛。果实近球形, 直径 6—8 毫米, 无毛, 具宿存内曲萼片。

产云南南部。生于海拔 1100—1300 米。分布印度、缅甸、老挝、越南。

### 36. 罗汉松叶石楠 图版 34:1—5

*Photinia podocarpifolia* Yü, *植物分类学报* 8:230. 1963.

灌木, 高 1—2 米; 小枝初密生白色绒毛, 后脱落无毛, 紫褐色, 有皮孔。叶片革质, 披针形或带状披针形, 长 4—6 厘米, 宽 8—15 毫米, 先端渐尖, 稀急尖, 基部渐狭成短柄, 边缘有远隔稀疏锯齿或几全缘, 上面深绿色, 无毛, 下面淡绿色, 幼时密生白

