

色绒毛,后脱落近无毛;侧脉7—10对;叶柄长2—5毫米,初密生白色绒毛,后脱落无毛。复伞房花序顶生,直径3—4厘米,密生10—20朵花;总花梗、花梗、萼筒及萼片均密生白色绒毛,果时渐脱落,前二者有褐色疣点;花梗长1—3毫米;苞片及小苞片膜质,线形,早落;花直径5—8毫米;萼筒钟状,直径约4毫米;萼片卵形,长约1毫米,先端急尖;花瓣白色,倒卵形,长5—6毫米,宽3—4毫米,先端圆钝,有极短爪,无毛;雄蕊20,远短于花瓣;子房3室,顶端密生柔毛;花柱3,基部合生,长约5毫米,柱头近头状。果实卵球形或近球形,长5—7毫米,直径5—6毫米,无毛,仅宿存萼片微被毛;种子2—3,长4—5毫米。花期5月,果期10月。

产贵州、广西。生于阳坡灌木丛中,海拔150—300米。模式标本采自贵州罗甸。

本种特点为叶片披针形或带状披针形,有稀疏锯齿或几全缘,近似罗汉松 *Podocarpus macrophylla* Don 的叶片,因以得名;幼枝、花序、萼筒、萼片及叶片下面密生白色绒毛,以后逐渐脱落近于无毛。和锐齿石楠柳叶变种 *P. arguta* Lindl. var. *salicifolia* (Dcne.) Vidal 相近,但后者叶片有贴生细锐锯齿,叶片较长,长5—9毫米,花朵较大,直径1.2—1.5厘米。又和窄叶石楠 *P. stenophylla* Hand.-Mazz. 比较,后者有锐锯齿叶,较长叶柄及无毛花序,可以区别。

37. 毛果石楠 图版 34:6—8

Photinia pilosicalyx Yü, 植物分类学报 8:231. 1963.

灌木,高约4米;小枝无毛,紫褐色,具皮孔;冬芽卵形,先端急尖,深褐色,具稀疏柔毛。叶片膜质,披针形或长圆披针形,稀倒披针形,长5—11厘米,宽1.5—4.5厘米,先端渐尖,基部楔形,边缘具尖锐锯齿,上面深绿色,微光亮,下面黄褐色,两面无毛,中脉在叶片上面凹下,在下面显明,侧脉9—10对;叶柄长5—7毫米,无毛。复伞房花序顶生,直径约4—8厘米;总花梗、花梗和萼筒外面均有黄色柔毛。幼果卵形,连同宿存萼片如坛子状,长5—6毫米,宽3—4毫米,有疏生柔毛,有近直立微内弯宿存萼片及2离生花柱。

产贵州。生于山脚密林中,海拔1200米。模式标本采自安龙龙山。

本种近似中华石楠 *P. beauverdiana* Schneid., 但叶片通常为披针形,总花梗、花梗和萼筒外面均有黄色柔毛;果实和宿存萼片如坛子状,易于区别。又与绒毛石楠 *P. schneideriana* Rehd. & Wils. 比较,本种叶片两面均无毛,果实及宿存萼片皆有柔毛,也易区别。

38. 毛叶石楠(中国树木分类学) 细毛扇骨木(江苏植物名录),鸡丁子、吉铃子、活鸡丁(山东土名)

