

P. villosa (Thunb.) DC. var. **sinica** Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:186 1912; Schneid. Ill. Handb. Laubh. 2:999. 1912; 陈嵘, 中国树木分类学 436. 1937; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 349. 图 558. 1959.——*Photinia subumbellata* var. *villosa* Card. in Lecomte, Not. Syst. 3:379. 1918 & in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26:571. 1920.——*Photinia cardotii* Metcalf in Journ. Arn. Arb. 20:440. 1939.——*Pourthiaea villosa* var. *sinica* (Rehd. & Wils.) Migo, 上海自然科学研究所汇报 14:311. 1944.

叶片椭圆形或长圆椭圆形, 稀长圆倒卵形, 长 4—8.5 厘米, 宽 1.8—4.5 厘米, 无毛; 伞房花序有花 5—8 朵, 稀达 15 朵; 花直径 1—1.5 厘米; 果实球形, 长 6—16 毫米, 直径 9—11 毫米, 无毛。

产甘肃、陕西、江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、四川、贵州、广东、广西。生于山坡疏林中, 海拔 1000—1500 米。模式标本采自湖北房县。

矮生灌木, 秋季叶变红色, 红色果实经冬不落, 常栽培供观赏; 种子油可制肥皂、作机械润滑油、制油漆; 木材可作农具。

系 2. 少花系 Ser. Pauciflorae Kuan, 植物分类学报 8:226, 1963.

本系有下列 2 种:

39. 小叶石楠(经济植物手册) 牛筋木(四川土名), 牛李子(湖南土名), 山红子(贵州土名)

Photinia parvifolia (Pritz.) Schneid. Ill. Handb. Laubh. 1:711. f. 392 o-o'. 1906; Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:189. 1912; Card. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 26:571. 1920; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 13:305. 1932; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7:483. 1933; Steward, Man. Vasc. Pl. Lower Yangtze Valley 169. 1958; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册 349. 图 558. 1959; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 30:258. 1970; 中国高等植物图鉴 2:214. 图 2158. 1972.——*Pourthiaea parvifolia* Pritz. in Engler, Bot. Jahrb. 29:389. 1900.——*Viburnum kmarovii* Lévl. & Vant. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9:78. 1910; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 66. 1915.——*Photinia subumbellata* Rehd. & Wils. in Sarg. Pl. Wils. 1:189. 1912; Wils. in Journ. Arn. Arb. 8:120. 1927.——*Pourthiaea laevis* var. *parvifolia* (Pritz.) Migo, 上海自然科学研究所汇报 14:311. 1944.——*Crataegus cavaleriei* auct. non Lévl. & Vant. 1908: Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 346. 1915.